

傷寒雜病論序（張機序）

論曰：余每覽越人入虢之診，望齊侯之色，未嘗不慨然歎其才秀也。怪當今居世之士，曾不留神醫藥，精究方術，上以療君親之疾，下以救貧賤之厄，中以保身長全，以養其生，但競逐榮勢，企踵權豪，孜孜汲汲，惟名利是務，崇飾其末，忽棄其本，華其外，而悴其內，皮

之不存，毛將安附焉。卒然遭邪風之氣，嬰非常之疾，患及禍至，而方震慄，降志屈節，欵望巫祝，告窮歸天，束手受敗，齎百年之壽命，書持至貴之重器，委付凡醫，恣其所措，咄嗟嗚呼！厥身已斃，神明消

局滅，變爲異物，幽潛重泉，徒爲涕泣，痛夫！舉世昏迷，莫能覺悟，印能愛身知己，遇災值禍，身居厄地，蒙蒙昧昧，蠢若遊魂。哀乎！趨傷勢之士，馳競浮華，不固根本，忘軀徇物，危若冰谷，至於是也。余

寒宗族素多，向余二百，建安紀元以來，猶未十稔，其死亡者，三分有二，傷寒十居其七。感往昔之淪喪，傷橫夭之莫救，乃勤求古訓，博采眾方，撰用《素問》、《九卷》、《八十一難》、《陰陽大論》、《胎臍藥

病錄》，並平脈辨證，爲《傷寒雜病論》合十六卷，雖未能盡愈諸病，論庶可以見病知源，若能尋余所集，思過半矣。夫天布五行，以運萬類，人稟五常，以有五臟，經絡腑俞，陰陽會通，玄冥幽微，變化難極，

桂自非才高識妙，豈能探其理致哉！上古有神農、黃帝、歧伯、伯高、林雷公、少俞、少師、仲文，中世有長桑、扁鵲，漢有公乘陽慶及倉公，古下此以往，未之聞也。觀今之醫，不念思求經旨，以演其所知，各承本家技，終始順舊，省疾問病，務在口給。相對須臾，便處湯藥，按寸不及尺，握手不及足，人迎趺陽，三部不參，動數發息，不滿五十，東短期未知決診，九候曾無彷彿，明堂闕庭，盡不見察，所謂窺管而已。

漢夫欲視死別生，實爲難矣。孔子云：「生而知之者上，學則亞之，多聞博識，知之次也。」余宿尙方術，請事斯語。

張漢長沙太守南陽張機序

景傷寒雜病論序（桂林左盛德序）

著余聞吾師張紹祖先生之言曰：「吾家傷寒一書，相傳共有一十三稿，每成一稿，傳抄殆遍城邑，茲所存者爲第十二稿，餘者或爲族人所秘，或付劫灰，不外是矣；叔和所得相傳爲第七次稿，與吾所藏者較，其

間闕如固多，編次亦不相類，或爲叔和所篡亂，或疑爲宋人所增刪，聚訟紛如，各執其說；然考晉時尚無刊本，猶是傳抄，唐末宋初始易傳抄爲刊刻，遂稱易簡，以此言之，則坊間所刊者，不但非漢時之原稿，恐亦非叔和之原稿也。」余聆訓之下，始亦疑之，及讀至傷寒例中一卷，見其於可汗不可汗，可吐不可吐，可下不可下法，盡載其中，醫於六經已具之條爲並不重引，法律謹嚴，始知坊間所刻之辨可汗不可汗，可吐不可吐，可下不可下，以及發汗、吐下後各卷，蓋後人以讀學書之法，錯雜其間，而未計及編書之法固不如是也。不然孔氏之徒，問仁者眾，問政者繁，何不各類其類，而憚煩若此耶！吾師諱學正，自言爲仲氏四十六世孫，自晉以後遷徙不一，其高祖復初公，自嶺南復遷原籍，寄居光州，遂聚族焉。吾師雖承家學，不以醫名，亦不出此書以示人，余得之受業者，殆有天焉。余好方術，得針灸之學於永川鄧師憲章公，後隨侍先嚴游宦嶺南，與吾師同寅，朝夕相過從，見余手執宋本傷寒論，笑問曰：「亦嗜此乎？」時餘年僅弱冠，答曰：「非敢云嗜，尚未得其要領，正尋繹耳。」師曰：「子既好學，復知針灸，可以讀傷寒論矣，吾有世傳抄本傷寒雜病論十六卷，向不示人，得人不傳，恐成墜緒。」遂歷言此書顛末，及吾師家世滔滔不倦。先嚴促余曰：「速下拜。」於是即席拜之，得師事焉。今羅生哲初爲吾邑知名人士，從習針灸，歷有年所，頗能好余之所好，余亦以所得者盡授之，余不負吾師，羅生亦必不負余，故特序其原起，羅生其志之，授之，余不負吾師，羅生亦必不負余，故特序其原起，羅生其志之，

傷寒雜病論卷第一

平脈法第一

問曰：脈何以知氣血臟腑之診也？

師曰：脈乃氣血先見，氣血有盛衰，臟腑有偏勝。氣血俱盛，脈陰陽俱盛；氣血俱衰，脈陰陽俱衰。氣獨盛者，則脈強；血獨盛者，則脈猛滑；氣偏衰者，則脈微；血偏衰者，則脈濇；氣血和者，則脈緩；氣血平者，則脈平；氣血亂者，則脈亂；氣血脫者，則脈絕；陽迫氣血，則脈數；陰阻氣血，則脈遲。若感於邪，氣血擾動，脈隨變化，變化排無窮，氣血使之。病變百端，本原別之，欲知病源，當憑脈變，欲知版

熱已去也。設令脈不和，處言已愈。設令向壁臥，聞師到，不驚起而盼視，若三言三止，脈之，嚥唾者，此詐病也。設令脈自和，處言此病大重，當須服吐下藥，鍼灸數十百處乃愈。

華師曰：假令人病，脈得太陽，與形證相應，因爲作湯，比還送湯，如食頃，病人乃大吐，若下利，腹中痛。師曰：我前來不見此證，今乃醫變異，是名災怪。又問曰：何緣作此吐利？師曰：或有舊時服藥，今書乃發作，故爲災怪耳。

中問曰：脈有災怪，何謂也？

印傷寒雜病論卷第二

印平脈法第二

傷問曰：脈有陰陽，何謂也？

寒師曰：凡脈大、浮、數、動、滑，此名陽也。凡脈沈、濇、弱、弦、微，此名陰也。凡陰病見陽脈者生，陽病見陰脈者死。

雜陰陽相搏，名曰動。陽動則汗出，陰動則發熱。形冷惡寒者，此三焦病傷也。若數脈見於關上，上下無頭尾，如豆大，厥厥然動搖者，名曰

論動也。脈來緩，時一止，復來者，名曰結。脈來數，時一止，復來者，名曰促。脈陽盛則促，陰盛則結，此皆病脈。又脈來動而中止，更來

桂小數，中有還者反動，名曰結陰也。脈來動而中止，不能自還，因而復動者，名曰代陰也，得此脈者，必難治。脈陰陽俱促，當病血，爲古實；陰陽俱結，當亡血，爲虛。假令促上寸口者，當吐血或衄；下尺

本中者，當下血。若乍促乍結爲難治。脈數者，久數不止，止則邪結，本正氣不能復，却結於臟，故邪氣浮之，與皮毛相得，脈數者，不可下，東下之必煩，利不止。

漢問曰：脈有陽結、陰結者，何以別之？

張師曰：其脈浮而數，能食不大便者，此爲實，名曰陽結也，期十七日仲四日當劇。其脈沈而遲，不能食，身體重，大便反鞭，名曰陰結也，期十

景脈藹藹，如車蓋者，名曰陽結也。脈繫繫，如循長竿者，名曰陰結也。脈聳聳，如羹上肥者，陽氣微也。脈繁繁，如蜘蛛絲者，陰氣衰也。

宗氣泄也；孤而下尺中者，精不藏也。若乍高乍卑，乍升乍墜，爲難治。寸口脈緩而遲，緩則陽氣長，其色鮮，其顏光，其聲商，毛髮長。遲

中則陰氣盛，骨髓生，血滿，肌肉緊薄鮮鞭，陰陽相抱，榮衛俱行，剛柔相得，名曰強也。

寸口脈浮爲在表，沈爲在裏，數爲在腑，遲爲在臟。假令脈遲，此爲在臟也。

書寸口脈浮緊，浮則爲風，緊則爲寒，風則傷衛，寒則傷榮，榮衛俱病，局骨節煩疼，當發其汗也。

寸口脈浮而數，浮爲風，數爲熱，風爲虛，虛爲寒，風虛相搏，則灑印漸惡寒也。

傷問曰：病有灑漸惡寒，而復發熱者何也？

寒師曰：陰脈不足，陽往從之，陽脈不足，陰往乘之。

雜何謂陽脈不足？

論師曰：假令寸口脈微，名曰陽不足。陰氣上入陽中，則灑漸惡寒也。

病何謂陰不足？

論師曰：假令寸口脈弱，名曰陰不足。陽氣下陷入陰中，則發熱也。陰脈弱者，則血虛，血虛則筋急也。其脈濇者，榮氣微也。其脈浮而汗出

桂如流珠者，衛氣衰也。榮氣微者，加燒鍼則血流不行更發熱而躁煩也。本腰痛，脛酸，所謂陽中霧露之氣。故曰清邪中上，濁邪中下。陰氣爲東慄，足膝逆冷，便溺妄出，表氣微虛，裏氣微急，三焦相溷，內外不全。

漢通，上焦怫鬱，臟氣相熏，口爛食斷也。中焦不治，胃氣上衝，脾氣不轉，胃中爲濁，榮衛不通，血凝不流。若胃氣前通者，小便赤黃，張與熱相搏，因熱作使，遊於經絡，出入臟腑，熱氣所過，則爲癰腫。

仲若陰氣前通者，陽氣厥微，陰無所使，客氣內入，嘔而出之，聲溫咽塞，寒厥相迫，爲熱所擁，血凝自下，狀如豚肝。陰陽俱厥，脾氣孤著弱，五液注下，下焦不闢，清便下重，令便數難，膀築湫痛，命將難

脈綿綿，如瀉漆之絕者，亡其血也。

問曰：脈有殘賊，何謂也？

問曰：脈有相乘，有縱有橫，有逆順，何謂也？

問曰：脈有弦、緊、浮、滑、沉、濇，此六者，名曰殘賊，能爲諸脈作病也。

師曰：水行乘火，金行乘木，名曰縱。火行乘水，木行乘金，名曰橫。水行乘金，火行乘木，名曰逆。金行乘水，木行乘火，名曰順也。

問曰：濡弱何以反適十一頭？

師曰：五臟六腑相乘，故令十一。

脈陰陽俱弦，無寒熱，爲病飲。在浮部，飲在皮膚；在中部，飲在經絡；在沉部，飲在肌肉。若寸口弦，飲在上焦；關上弦，飲在中焦；尺中弦，飲在下焦。

脈弦而緊者，名曰革也。弦者，狀如弓弦，按之不移也。緊者，如轉索無常也。

師曰：假令亡汗，若吐，以肺裏寒，故令脈緊也。假令欬者，坐飲冷水，令脈緊也。假令下利，以胃虛冷，故令脈緊也。

寸口脈浮而緊，醫反下之，此爲大逆。浮則無血，緊則爲寒，寒氣相搏，則爲腸鳴。醫乃不知，而反飲冷水，令汗不出，水得寒氣，冷必相搏，其人即瘧。

寸口脈微，尺脈緊，其人虛損多汗，知陰常在，絕不見陽也。寸口脈浮而大，浮爲風虛，大爲氣強，風氣相搏，必成癰瘍，身體爲癰瘍者，名曰泄風，久久爲癰瘍。

寸口脈浮而大，浮爲虛，大爲實，在尺爲關，在寸爲格，關則不得小便，格則吐逆。

寸口脈微而濇，微者衛氣不行，濇者榮氣不逮。榮衛不能相將，三焦猛無所仰，身體痺不仁。榮氣不足，則煩疼，口難言；衛氣虛者，則惡寒數欠。三焦不歸其部，上焦不歸者，噫而酢呑；中焦不歸者，不能消穀引食；下焦不歸者，則遺瀉。

寸口脈微而濇，微者衛氣衰，濇者榮氣不足。衛氣衰，則面色黃；榮氣解也。若不虛，若欲自解，但汗出耳，不發戰也。

問曰：病有不戰而汗出解者，何也？

師曰：脈大而浮數，故不戰而汗出解也。

問曰：病有不戰，不汗出而解者，何也？

師曰：其脈自微，此以曾發汗，若吐，若下，若亡血，以內無津液，此陰陽自和，必自愈，故不戰而汗出而解也。

問曰：病有不戰，不汗出而解者，何也？

師曰：其脈浮數，此以曾發汗，若吐，若下，若亡血，以內無津液，此陰陽自和，必自愈，故不戰而汗出而解也。

問曰：傷寒三日，脈浮數而微，病人身涼和者，何也？

師曰：其脈自微，此以曾發汗，若吐，若下，若亡血，以內無津液，此陰陽自和，必自愈，故不戰而汗出而解也。

問曰：傷寒三日，脈浮數而微，病人身涼和者，何也？

師曰：其脈浮數，此以曾發汗，若吐，若下，若亡血，以內無津液，此陰陽自和，必自愈，故不戰而汗出而解也。

問曰：伏氣之病，以意候之，今月之內，欲知伏氣，假令舊有伏氣，當須脈之，若脈微弱者，當喉中痛似傷，非喉痺也。病人云：實咽中痛，雖爾，今復宜下之。

師曰：病家人請，云：病人苦發熱，身體疼，病人自臥，師到，診其猛脈，沉而遲者，知其差也。何以知之？凡表有病者，脈當浮大，今反沉遲，故知愈也。假令病人云：腹內卒痛，病人自坐，師到，脈之，夷東夷

妊娠脈弦數而細，少腹痛，手心熱，此爲熱結胞中。不先其時治之，必有產難。

產後脈洪數，按之弦急，此爲濁未下。若濁已下，而脈如故者，此爲中魂脫，爲難治。

華諸脈浮數，當發熱而灑淅寒寒。若有痛處，飲食如常者，畜積有膿也。

醫師曰：人恐怖者，其脈何狀？

書問曰：人不飲，其脈何類？

局師曰：其脈自濡，唇口乾燥也。

印師問曰：人愧者，其脈何類？

傷師曰：脈浮而面色乍白乍赤。

傷師曰：寸口諸微亡陽，諸濡亡血，諸弱發熱，諸緊爲寒。諸乘寒者則寒爲厥，鬱冒不仁，以胃無穀氣，脾濇不通，口急不能言，戰而慄也。

桂師曰：發熱則脈躁，惡寒則脈靜。脈隨證轉者，爲病瘧。

雜師曰：傷寒，欸逆，上氣，其脈散者，死，爲其形損故也。

病師曰：脈乍大乍小，乍靜乍亂，見人驚恐者，爲祟發於膽，氣竭故也。

論師曰：人脈皆無病，暴發重病，不省人事者，爲厲鬼。治之以祝由，能言者，可治；不言者，死。

桂師曰：脈浮而洪，身汗如油，喘而不休，水漿不下，體形不仁，乍靜乍亂，此爲命絕也。又未知何臟先受其災，若汗出髮潤，喘不休者，

古此爲肺先絕也。陽反獨留，形體如煙熏，直視搖頭者，此爲心絕也。

本脾絕也。溲便遺失，狂言，目反直視者，此爲腎絕也。又未知何臟陰

東陽前絕，若陽氣前絕，陰氣後竭者，其人死，身色必青。陰氣前絕，漢陽氣後竭者，其人死，身色必赤，腋下溫，心下熱也。

張奇經八脈不繫十二經，別有自行道路。其爲病，總於陰陽；其治法，屬十二經。假令督脈爲病，脊背強，隱隱痛，脈當微浮而急，按之濇，伸治屬太陽。

景任脈爲病，其內結痛，疝瘕，脈當沉而結，治屬太陰。

著沖脈爲病，苦腹痛，腰間冷痛，脈當沉而細，治屬少陰。

陽蹻爲病，中於側，氣行於外，脈當弦急，按之緩，治屬少陽。

陰蹻爲病，中於側，氣行於內，脈當浮緩，按之微急而弦，治屬厥陰。陽維與諸陽會，其爲病，在脈外，發寒熱，脈當浮而虛，治屬氣分。陰維與諸陰交其爲病，在脈中，心中痛，手心熱，脈當弦而濇，治屬血分。

奇經八脈之爲病，由各經受邪，久久移傳，或勞傷所致，非暴發也。

師曰：督脈傷，柔柔不欲伸，不能久立，立則隱隱而脹。任脈傷，小院便多，其色白濁。冲脈傷，時咳不休，有聲無物，勞則氣喘。帶脈傷，回身一周冷。陽蹻傷，則身左不仁；陰蹻傷，則身上不仁。陽維傷，則畏寒甚，皮常濕，陰維傷，則畏熱甚，皮常枯。

問曰：八脈內傷，其脈何似？

師曰：督脈傷，尺脈大而濇。任脈傷，當補精。冲脈傷，當補氣。帶脈傷，而濁。帶脈傷，脈沉遲而結。陽蹻傷，脈時大時弦。陰蹻傷，脈時細時弦。陽維傷，脈時緩時弦。陰維傷，脈時緊時濇。

問曰：其治奈何？

師曰：督脈傷，當補髓。任脈傷，當補精。冲脈傷，當補氣。帶脈傷，當補腎。陽蹻傷，則益膽。陰蹻傷，則補肝。陽維傷，則調衛。陰維傷，則養榮。

問曰：其處方奈何？

師曰：相體虛實，察病輕重，採取方法，權衡用之，則無失也。

六氣主客第三

問曰：六氣主客何以別之？

師曰：厥陰生少陰，少陰生少陽，少陽生太陰，太陰生陽明，陽明生太陽，太陽復生厥陰，周而復始，久久不變，年復一年，此名王氣。庚

厥陰生少陰，少陰生太陰，太陰生少陽，少陽生陽明，陽明生太陽，猛

復生厥陰，周而復始，此名客氣。

問曰：其始終奈何？

師曰：初氣始於大寒，二氣始於春分，三氣始於小滿，四氣始於大暑，排五氣始於秋分，終氣始於小雪，仍終於大寒，主客相同，其差各三十版

刺期門、巨闕。

趺陽脈浮而濇，少陰脈如經者，其病在脾，法當下利。何以知之？若

脈浮大者氣實血虛也。今趺陽脈浮而濇，故知脾氣不足，胃氣虛也，陝中消而水化也。穀入於胃，脈道乃行，水入於經，其血乃成。榮盛，則

華其膚必疏。三焦失經，名曰血崩。

醫寸口脈弱而緩，弱者陽氣不足，緩者胃氣有餘，噫而吞酸，食卒不下，著

傷寸口脈弱而緩，弱者衛氣微，遲者榮中寒。榮爲血，血寒則發熱；衛

書寸口脈弱而遲，弱者衛氣微，遲者榮中寒。榮爲血，血寒則發熱；衛

中爲氣，氣微者，心內飢，飢而虛滿不能食也。

局爲氣，氣微者，心內飢，飢而虛滿不能食也。

寸口脈弱而緩，弱者陽氣不足，緩者胃氣有餘，噫而吞酸，食卒不下，

印寸口脈弱而緩，弱者陽氣不足，緩者胃氣有餘，噫而吞酸，食卒不下，

傷寸口脈弱而緩，弱者陽氣不足，緩者胃氣有餘，噫而吞酸，食卒不下，

桂寸口脈弱而緩，弱者陽氣不足，緩者胃氣有餘，噫而吞酸，食卒不下，

古寸口脈弱而緩，弱者陽氣不足，緩者胃氣有餘，噫而吞酸，食卒不下，

漢寸口脈弱而緩，弱者陽氣不足，緩者胃氣有餘，噫而吞酸，食卒不下，

本寸口脈弱而緩，弱者陽氣不足，緩者胃氣有餘，噫而吞酸，食卒不下，

仲寸口脈弱而緩，弱者陽氣不足，緩者胃氣有餘，噫而吞酸，食卒不下，

此非本病，醫特下之所爲也。榮衛內陷，其數先微，脈反但浮，其人

景必大便鞭，氣噫不除，何以言之？本以數脈動脾，其數先微，故知脾

張醫咎，責虛取實，守空迫血，脈滑則爲噫。脈浮，鼻中燥者，必衄也。

著氣不治，大便必鞭，氣噫不除，令脈反浮。其數改微，邪氣獨留，心

中則餓。邪熱不殺穀，潮熱，發渴，數脈當遲緩，病者則飢。數脈不

時，則生惡瘡也。

太陽之勝，則病痔瘡，發寒，厥入胃則內生心痛，陰中乃瘍，隱曲不利，直引陰股，筋肉拘苛，血脈凝泣，絡滿血變，或爲血泄，皮膚痞腫，腹滿時減，熱反上行，頭項、凶頂、腦戶中痛，目如脫，寒入中焦，則傳爲濡泄；其復也，則心胃生寒，胸膈不利，心痛，痞滿，頭暉痛，善悲，時發眩仆，食減，腰椎反痛，屈伸不便，少腹控睾引腰脊，上沖心，唾出清水，及爲嘔噫，甚則入心，善忘，寒腹內餘，則腰尻痛，屈伸不利，股脛足膝中痛。此六氣之病，須謹識之而弗失書也。

局師曰：子知六氣，不知五運，未盡其道，今爲子言。假如太陽司天，而運當甲己，夫甲己土運也，太陽寒水也，土能剋水，太陽不能正其位也。又如厥陰司天，而逢乙庚金運。少陰少陽司天，而逢丙辛水運。傷寒問曰：其治法奈何？

太陰司天，而逢丁壬木運。陽明司天，而逢戊癸火運。其例同也。

傷寒師曰：風寒暑濕燥熱，各隨其氣，有假者反之，甚者從之，微者逆之，採取方法，慎勿亂也。

度也。

問曰：司天，在泉奈何？

師曰：此客氣也。假如子午之年，少陰司天，陽明則爲在泉。大陽爲中初氣，厥陰爲二氣，司天爲三氣，太陰爲四氣，少陽爲五氣，在泉爲華終氣。卯酉之年，陽明司天，少陰在泉。則初氣太陰，二氣少陽，三氣陽明，四氣太陽，五氣厥陰，終氣少陰。戌辰之年，太陽司天，太陰在泉。丑未之年，太陰司天，太陽在泉。寅申之年，少陽司天，厥書陰在泉。巳亥之年，厥陰司天，少陽在泉。其餘各氣，以例推之。

局問曰：其爲病也何如？

印師曰：亦有主客之分也。

假如厥陰司天，主勝則胸脇痛，舌難以言；客勝則耳鳴，悼眩，甚則傷咳逆。

病太陰司天，主勝則胸腹滿，食已而瞀；客勝則手、面、跗腫，呼吸氣論喘。

寒少陰司天，主勝則心熱，煩躁，脇痛，支滿；客勝則鼽嚏，頸項強，桂外發，及爲丹癰，瘡瘍，嘔逆，喉痹，頭痛，嗌腫，耳聾，血溢，內林爲癥癰。

古陽明司天，主勝則清腹內遺，咳，衄，嗌塞，心膈中熱，咳不止而白本血出者死。金居少陽之位，客不勝主也。

東厥陰在泉，主勝則筋骨搖，並腰腹時痛；客勝則關節不利，內爲經強，漢外爲不便。

張少陰在泉，主勝則厥氣上行，心痛發熱，膈中眾瘡皆作，發於胠腋，魄汗不藏，四逆而起；客勝則腰痛，尻、股、膝、髀、腨、臍、足病，仲督熱以酸，跗腫不能久立，溲便變。

景太陰在泉，主勝則寒氣逆滿，食欲不下，甚則爲疝；客勝則足痿，下腰腹痛而反惡寒，甚則下白，溺白。

問曰：其勝復何如？
師曰：有勝必有復，無勝則無復也。
厥陰之勝，則病耳鳴，頭眩，憒憒欲吐，胃脇如寒，胠脇氣並，化而爲熱，小便黃赤，胃脇當心而痛，上及兩胠，腸鳴，飧泄，少腹痛，注下赤白，甚則嘔吐，膈不通；其復也，則少腹堅滿，裏急暴痛，厥心痛，汗發，嘔吐，飲食不入，入而復出，筋骨掉眩，清厥，甚則入脾，食痹而吐。
少陰之勝，則病心下熱，善飢，臍下反動，氣遊三焦，嘔吐，煩躁，腹滿而痛，溏泄赤沃；其復也，則燠熱內作，煩躁，鼽嚏，少腹絞痛，嗌燥，氣動於左，上行於上，咳則皮膚痛，暴喑，心痛，鬱冒不知人，灑淅惡寒，振慄，譫妄，寒已而熱，渴而欲飲，少氣，骨痿，膈腸不便，外爲浮腫，噦噫，癥疹，瘡瘍，癰疽，瘻痔，甚則入肺，咳而鼻淵。
太陰之勝，則火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外，病在胠脇，甚則心痛，熱格，頭痛，喉痹，項強，又或濕氣內鬱，寒迫下焦，少腹滿，腰椎痛強，注泄，足下濕，頭重，跗腫，足胫腫，飲發於中，附腫於上，其復也，則體重中滿，食飲不化，陰氣上厥，胸中不便，飲發於中，咳喘有聲，頭項痛重，掉瘛尤甚，嘔而密默，唾吐清液，甚則入腎，竊泄無度。
少陽之勝，則病客熱於胃，心煩而痛，目赤，嘔酸，善飢，耳痛，溺赤，善驚，譫妄，暴熱消爍，少腹痛，下沃赤白；其復也，枯躁，煩熱，驚瘛，咳，衄，心熱，煩躁，便數，憎風，厥氣上行，面如浮埃，目乃睭聾，火氣內發，上爲口糜，嘔逆，血溢，血泄，發而爲瘻，惡寒鼓慄，寒極反熱，嗌絡焦槁，渴飲水漿，色變黃赤，少氣，肺痿，化而爲水，傳爲附腫，甚則入肺，咳而血泄。
陽明之勝，則清發於中，左胠脇痛，溏泄，內爲嗌塞，外發頽瘡，胸中不便，嗌而咳；其復也，則病生胠脇，氣歸於左，善太息，甚則心痛，痞滿，腹脹而泄，嘔苦，咳嗽，煩心，病在膈中，甚則入肝，驚瘓，駭筋掣。

六氣

【主氣】：厥陰生少陰，少陰生少陽，少陽生太陰，太陰生陽明，陽明生太陽，太陽復生厥陰。

周而復始，久久不變，年復一年。

初氣			二氣			三氣			四氣			五氣			終氣								
始於大寒			始於春分			始於小滿			始於大暑			始於秋分			始於小雪								
厥陰風木			少陰君火			少陽相火			太陰濕土			陽明燥金			太陽寒水								
大 寒	立 春	雨 水	驚 蟄	春 分	清 明	穀 雨	立 夏	小 滿	芒 種	夏 至	小 暑	大 暑	立 秋	處 暑	白 露	秋 分	寒 露	霜 降	立 冬	小 雪	大 雪	冬 至	小 寒

【客氣】：厥陰生少陰，少陰生太陰，太陰生少陽，少陽生陽明，陽明生太陽，復生厥陰。

初氣	二氣	三氣（司天）	四氣	五氣	終氣（在泉）
始於大寒	始於春分	始於小滿	始於大暑	始於秋分	始於小雪

司天：主上半身。

子	丑	寅	卯	辰	巳
少陰君火	太陰濕土	少陽相火	陽明燥金	太陽寒水	厥陰風木
牛	未	申	酉	戌	亥
少陰君火	太陰濕土	少陽相火	陽明燥金	太陽寒水	厥陰風木

*舉例：

	初氣	二氣	三氣（司天）	四氣	五氣	終氣（在泉）
子午之年	始於大寒	始於春分	始於小滿	始於大暑	始於秋分	始於小雪
主氣	厥陰風木	少陰君火	少陽相火	太陰濕土	陽明燥金	太陽寒水
客氣	太陽寒水	厥陰風木	少陰君火	太陰濕土	少陽相火	陽明燥金
勝刺	第一，客氣的司天為主上半年天氣，也就是初、二、三氣，而客氣的在泉為主下半年地氣，也就是四、五、終氣。若雀氣顯示氣為主氣較旺則為主勝，若客氣較旺則為客勝。以初氣為言，若風氣多則為主勝，若火氣多則為客勝。 第二，若是陽明燥金司天，因為其位在少陽火位，金不勝火，所以客氣便不勝主氣了。而若是太陽在泉，則水在水位，就無所謂勝負了。 最後，令人奇怪的是，若依照第二來說，則少陽相火司天，其位在少陽位，因無所謂勝負，但卻有。而少陰君火在泉，火在水位，則客氣不勝主氣，但還是有客勝，不知為何？					

※在泉：吉下半年。

子	丑	寅	卯	辰	巳
陽明燥金	太陽寒水	厥陰風木	少陰君火	太陰濕土	少陽相火
午	未	申	酉	戌	亥
陽明燥金	太陽寒水	厥陰風木	少陰君火	太陰濕土	少陽相火

中華醫局印書局	中華醫局印書局	中華醫局印書局	中華醫局印書局	中華醫局印書局	中華醫局印書局	中華醫局印書局
著 張仲景傷寒例第四時，八節立春正月，清明三月，立夏四月，驚蟄二月，	正月	二月	三月	四月	五月	六月

傷寒例第四

仲四時，八節，二十四氣，七十二候，決病法。
景立春正月，節斗指艮。雨水正月，中斗指寅。
者驚蟄二月，節斗指甲，春分二月，中斗指卯。
清明三月，節斗指乙。穀雨三月，中斗指辰。
立夏四月，節斗指巽。小滿四月，中斗指己。

正月		二月		三月		四月		五月		六月	
立春	雨水	驚蟾	春分	清明	穀雨	立夏	小滿	芒種	夏至	小暑	大暑
艮	寅	甲	卯	乙	辰	巽	巳	丙	午	丁	未
七月		八月		九月		十月		十一月		十二月	
立秋	處暑	白露	秋分	寒露	霜降	立冬	小雪	大雪	冬至	小寒	大寒
坤	申	庚	酉	辛	戌	乾	亥	壬	子	癸	丑

芒種五月，節斗指內。夏至五月，中斗指午。
小暑六月，節斗指丁。大暑六月，中斗指未。
立秋七月，節斗指坤。處暑七月，中斗指申。
白露八月，節斗指庚。秋分八月，中斗指酉。
寒露九月，節斗指辛。霜降九月，中斗指戌。
立冬十月，節斗指乾。小雪十月，中斗指亥。
大雪十一月，節斗指壬。冬至十一月，中斗指子。
小寒十二月，節斗指癸。大寒十二月，中斗指丑。
二十四氣，節有十二，中氣有十二，五日爲一候，氣亦同，合有七十

傳太陰，脈濡而大，發熱，下利，口渴，腹中急痛，宜茯苓白朮厚朴石膏黃芩甘草湯。

茯苓白朮厚朴石膏黃芩甘草湯方：

中茯苓四兩 白朮三兩 厚朴四兩 石膏半斤 黃芩三兩 甘草二兩（炙）

華上六味，以水一斗，煮取五升，每服一升五合餘，日三服。

醫傳少陰，脈沉細而數，手足時厥時熱，咽中痛，小便難，宜附子細辛黃連黃芩湯。

書附子細辛黃連黃芩湯方：

局附子大者一枚（炮，去皮，破八片）細辛二兩 黃連四兩 黃芩二兩

上四味，以水六升，煮取三升，溫服一升，日三服。

印傳厥陰，脈沉弦而急，發熱，時悚，心煩，嘔逆，宜桂枝當歸湯。吐傷蛇者，宜烏梅丸。

寒桂枝當歸湯方：

桂枝二兩 當歸三兩 半夏一升 茄藥三兩 黃柏二兩 甘草二兩（炙）

雜上六味，以水七升，煮取四升，去滓，分溫三服。

病烏梅丸方：

論烏梅三百枚 細辛六兩 乾薑十兩 黃連十六兩 當歸四兩 人參六兩

桂附子六兩（炮，去皮）蜀椒四兩（出汗）桂枝六兩（去皮）黃柏六兩

桂上十味，異搗篩，合治之，以苦酒漬烏梅一宿，去核蒸之，五斗米下，林飯熟，搗成泥，和藥令相得，納臼中與蜜杵二千下，丸如梧桐子大，

古先食飲服十九，日三服，稍加至二十九。禁生冷、滑物、臭食等。

本若兩感於寒者，一曰，太陽受之，即與少陰俱病，則頭痛、口乾、煩

東滿而渴，脈時浮時沉，時數時細，大青龍湯加附子主之。

東大青龍湯加附子方：

漢麻黃六兩（去節）杏仁四十枚（去皮尖）大棗十枚（劈）生薑三兩（切）

張附子一枚（炮，去皮，破八片）石膏如雞子大 桂枝二兩（去皮）

甘草二兩（炙）

仲上八味，以水九升，先煮麻黃，減二升，去上沫，納諸藥，煮取三升，

景去滓，溫服一升，取微似汗，汗出多者，溫粉粉之，一服汗者，停後

著服。若復服，汗多亡陽，遂虛，惡風，煩躁，不得眠也。

二曰，陽明受之，即與太陰俱病，則腹滿、身熱、不欲食、譫語、脈

時高時卑，時強時弱，宜大黃石膏茯苓白朮枳實甘草湯。

論尺寸俱浮者，太陽受病也，當一二日發，以其脈上連風府，故頭項痛、

腰脊強。桂尺寸俱長者，陽明受病也，當二三日發，以其脈夾鼻絡於目，故身熱、

林汗出、目痛、鼻乾、不得臥。

古尺寸俱弦者，少陽受病也，當三四日發，以其脈循脇，絡於耳，故胸

病凡傷於寒，傳經則爲病熱，熱雖甚，不死。若兩感於寒而病者，多死。

華怒。是以春傷於風，夏必飧泄；夏傷於暑，秋必病瘧；秋傷於濕，冬必咳

一陰氣上也。斯則冬夏二至，陰陽合也。春秋二分，陰陽離也。陰陽

交易，人變病焉。此君子春夏養陽，秋冬養陰，順天地之剛柔也。小

書人觸冒，必嬰暴疹，須知毒烈之氣留在何經，必發何病，詳而取之。

印曰淺深，以施方治。今世人傷寒，或始不早治，或治不對病，或日數傷久淹，困乃告醫，醫人又不依次第而治之，則不中病。皆宜臨時消息

寒制方，無不効也。

又土地溫涼高下不同，物性剛柔儉居亦異，是故黃帝興四方之間，岐

伯舉四治之能，以訓後賢，開其未悟，臨病之工，宜須兩審也。

病凡傷於寒，傳經則爲病熱，熱雖甚，不死。若兩感於寒而病者，多死。

論尺寸俱浮者，太陽受病也，當一二日發，以其脈上連風府，故頭項痛、

腰脊強。

大黃石膏茯苓白朮枳實甘草湯方：

大黃四兩 石膏一斤 茯苓三兩 白朮四兩 枳實三兩 甘草三兩（炙）

上六味，以水八升，煮取五升，溫分三服。

三日，少陽受之，即與厥陰俱病，則耳聾、囊縮而厥，水漿不入，脈中

厥弦急，乍細乍散，宜當歸附子湯主之。

乍弦急，乍細乍散，宜當歸附子湯主之。

當歸附子湯：

當歸四兩 附子大者一枚（炮，去皮，破八片）人參三兩 黃連三兩 黃柏三兩

上五味，以水六升，煮取三升，溫服一升，日三服。

以上皆傳經變病，多不可治，不知人者，六日死。若三陰、三陽、五臟、六腑皆受病，則榮衛不行，臟腑不通則死矣，所謂兩感於寒，不免於死者，其在斯乎！其在斯乎！

若不加異氣者，至七日，太陽病衰，頭痛少愈也。八日，陽明病衰，身熱少歇也。九日，少陽病衰，耳聾微聞也。十日，太陰病衰，腹減如故，則思飲食。十一日，少陰病衰，渴止，舌乾，已而嘔。十二日，厥陰病衰，囊縱、少腹微下，大氣皆去，病人精神爽慧也。若過十三日以上，不間，尺寸陷者，大危。若更感異氣，變爲他病者，當依氣病證法而治之。若脈陰陽俱盛，重感於寒者，變爲溫瘡。陽脈浮滑，陰脈濡弱者，更傷於風者，變爲風溫。陽脈洪數，陰脈實大，更遇溫者，變爲溫毒。溫毒，病之最重者也。陽脈濡弱，陰脈弦緊，更遇溫氣者，變爲溫疫。以此冬傷於寒，發爲溫病，脈之變證，方治如說。

凡人有疾，不時即治，隱忍冀差，以成痼疾。小兒女子，益以滋甚。時氣不和，便當早言，尋其邪由，及在腠理，以時治之，罕有不愈者。患人忍之，數日乃說，邪氣入臟，則難爲制。

凡作湯藥，不可避晨夕，覺病須臾，即宜便治，不等早晚，則易愈矣。如或差遲，病即傳變，雖欲除治，必難爲力。服藥不如方法，縱意違師，不須治之。

凡傷寒之病，多從風寒得之。始表中風寒，入裏則不消矣。未有溫覆猛當而不消散者。不在證治，擬欲攻之，猶當先解表，乃可下之。若表未解而納不消，必非大滿，猶有寒熱，則不可下。若表已解而納不消，大滿，大實，腹堅，中有燥屎，自可下之，雖四五日，數下之，不能排爲禍也。若不宜下而便攻之，則內虛熱入，協熱遂利，煩躁諸變，不版夷。

上四味，以水九升，先煮麻黃減二升，去上沫，納諸藥，煮取二升半，去滓，溫服八合，覆取微似汗，不須粥飲，餘如桂枝湯法將息。桂枝湯見後卷。

傳陽明，脈大而數，發熱，汗出，口渴，舌燥，宜白虎湯，不差與承中氣湯。

大承氣湯方：

大黃四兩（酒洗）厚朴半斤（炙，去皮）枳實五枚 芒硝三合

上四味，以水一斗，煮米熟，湯成去滓，溫服一升，日三服。

白虎湯方：

大黃四兩 石膏一斤（碎）甘草二兩（炙）粳米六合

知母六兩 大黃四兩（酒洗）厚朴半斤（炙，去皮）枳實三枚 大者（炙）

上三味，以水四升，煮取二升半，去滓，分溫二服，初服當更衣，不爾者，盡飲之，若更衣者，勿服之。

小承氣湯方：

大黃四兩（酒洗）厚朴半斤（炙，去皮）枳實三枚 芒硝半升

上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分溫二服，初服當更衣，溫頓服之，以調胃氣。

傳少陽，脈弦而急，口苦，咽乾，頭暈，目眩，往來寒熱，熱多寒少，宜小柴胡湯。不差，與大柴胡湯。

小柴胡湯方：

柴胡半斤 黃芩三兩 茄藥三兩 半夏半升（洗）生薑五兩（切）

半夏半升

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升，日三服。

大柴胡湯方：

柴胡四枚（炙）大棗十二枚（擘）大黃二兩

上八味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎，溫服二升，日三服。

宿食在上院者，當吐之。

動氣在右，不可下之，下之則津液內竭，咽燥、鼻乾、頭眩、心悸也。中身熱，臥則欲蜷。

華動氣在上，不可下之。下之則掌中熱煩，身上浮冷，熱汗自泄，欲得水自灌。

醫動氣在下，不可下之。下之則腹脹滿，卒起頭眩，食則下利清穀，心書下痞。

局咽中閉塞，不可下之。下之則上輕下重，水漿不下，臥則欲蜷，身急痛，下利日數十行。

印諸外實者，不可下之。下之則發微熱，若亡脈，厥者，當臍握熱。傷諸虛者，不可下之。下之則大渴，求水者易愈，惡水者劇。

寒脈濡而弱，弱反在關，濡反在顱，弦反在上，微反在下。弦爲陽運，微爲陰寒。上實下虛，意欲得溫。微弦爲虛，虛者不可下也。微弦爲咳，咳則吐涎，下之則咳止，而利因不休，利不休則胸中如蟲噉，粥病入則出，小便不利，兩脅拘急，喘息爲難，頸背相引，臂則不仁，極論寒反出汗，身冷若冰，眼睛不慧，語言不休，而穀氣多入，此爲除中，口雖欲言，舌不得前。

桂脈濡而弱，弱反在關，濡反在顱，浮反在上，數反在下。浮爲陽虛，林數爲無血，浮爲虛，數生熱。浮爲虛，自汗出而惡寒，振而寒慄；微古弱在關，胸下爲急，喘汗而不得呼吸；數爲痛，呼吸之中，痛在於脅，本振寒相搏，形如瘡狀，醫反下之，故令脈數，發熱，狂走，見鬼，心下爲痞，小便淋漓，小腹甚鞭，小便溺血也。東脈濡而緊，濡則衛氣微，緊則榮中寒。陽微衛中風，發熱而惡寒；榮漢緊胃氣冷，微嘔心內煩。醫謂有大熱，解肌而發汗，亡陽虛煩躁，心下苦痞堅。表裡俱虛竭，卒起而頭眩。客熱在皮膚，悵快不得眠。不張知胃氣冷，緊寒在關元。技巧無所施，汲水灌其身。客熱應時罷，慄伸慄而振寒。重被而覆之，汗出而冒顱。體惕而又振，小便爲微難。寒景氣因水發，清穀不容開。嘔變反腸出，顛倒不得安。手足爲微逆，身著冷而內煩。遲欲從後救，安可復追還。脈浮而緊，浮則爲風，緊則爲寒；風則傷衛，寒則傷榮；榮衛俱病，骨節煩疼；當發其汗，而不可下也。

可勝數。輕者困篤，重者必死矣。

夫陽盛陰虛，汗之則愈，下之則死。如是，則神丹安可以誤發，甘遂何可以妄攻，虛盛之治，相背千里，中吉凶之機，應若影響，豈容易哉！况桂枝下咽，陽盛則斃，承氣入胃，華陰盛以亡。死生之要，在乎須臾，視身之盡，不暇計日。此陰陽虛實之交錯，其候至微，發汗吐下之相反，其禍至速，而醫術淺狹，懵然不知病源，爲治乃誤，使病者殞歿，自謂其分，至令冤魂塞於冥路，書死屍盈於曠野，仁者鑒此，豈不痛歟！

醫局凡兩感病俱作，治有先後，發表攻裏，本自不同，而執迷用意者，乃印云：神丹甘遂合而飲之，且解其表又除其裏，言巧似是，其理實違。夫智者之舉錯也，常審以慎，愚者之動作也，必果而速，安危之辨，傷豈可詭哉！世上之士，但務彼翕習之榮，而莫見此傾危之敗。惟明者寒居，然能護其本，近取諸身，夫何遠焉！

寒凡發汗，溫暖藥，其方雖言日三服，若病劇不解，當促其間，可半雜日中盡三服，若與病相阻，即便有所覺。病重者，一曰一夜當暉時觀病之，如服一劑，病證猶在，故當復作本湯服之，至有不能汗出，服三論劑乃解，若汗不出者，死病也。

桂凡得時氣病，至五六日，而渴欲飲水，飲水不能多，不當與也，何者？以腹中熱尚少，不能消之，便更與人作病也。至七八日，大渴欲飲水，林者，猶當依證而與之，與之，時常令不足，勿極意也。言能飲一斗，古與五升，若飲而腹滿，小便不利，若喘，若嘔，不可與之也，忽然大汗出，是爲自愈也。

仲脈六損，一時死。平人三息，病人脈一至，名曰六損。著脈四損，經氣絕。五損，腑氣絕。六損，臟氣絕。真氣不行於經，曰經

脈浮而大，心下反鞭，有熱，屬臟者，攻之，不令發汗；屬腑者，不令洩數。洩數則大便鞭，汗多則越甚，脈遲者，尙未可攻也。

傷寒，脈陰陽俱緊，惡寒發熱，則脈欲厥。厥者，脈初來大，漸漸小，西更來漸大，是其候也。如此者惡寒，甚者，翕翕汗出，喉中痛；若熱中多者，目赤脈多，睛不慧，醫復發之，咽中則傷；若復下之，則兩目閉，寒多便清穀，熱多便虧血。若熏之，則身發黃；若熨之，則咽燥。

傷寒發熱，口中勃勃氣出，頭痛，目黃，衄不可制，陰陽俱虛，貪水院者必嘔，惡水者厥。若下之，則咽中生瘡；假令手足溫者，必下重便

小便不利者，可救之；小便難者，危殆也。

若小便利者，可救之；小便難者，危殆也。

閉，寒多便清穀，熱多便虧血。若熏之，則身發黃；若熨之，則咽燥。

傷寒發熱，口中勃勃氣出，頭痛，目黃，衄不可制，陰陽俱虛，貪水院咽喉塞，汗之則戰慄；惡水者，下之則裡冷，不嗜食，大便完穀出，汗之則口中傷，舌上白苔，煩躁，脈反數，不大便，六七日後必便血，小便不利也。

凡服下湯，得利便止，不必盡劑。此以前是汗吐下三法之大要也。若能於此例之外，更神而明之，斯道其庶幾乎？

雜病例第五

問曰：上工治未病，何也？

師曰：夫治未病者，見肝之病，知肝傳脾，當先實脾，四季脾王不受邪，即勿補之。中工不曉相傳，見肝之病，不解實脾，惟治肝也。夫

肝之病，補用酸，助用焦苦，益用甘味之藥調之。酸入肝，焦苦入心，甘入脾。脾能傷腎，腎氣微弱，則水不行；水不行，則心火氣盛，心火氣盛則傷肺；肺被傷，則金氣不行；金氣不行，則肝氣盛，肝必自愈。此治肝補脾之要妙也。肝虛則用此法，實則不可用之。經曰：勿虛虛，勿實實，補不足，損有餘，是其義也。餘臟准此。

夫人稟五常，因風氣而生長，風氣雖能生萬物，亦能害萬物，如水能

浮舟，亦能覆舟。若五臟元真通暢，人即安和。客氣邪風，中人多死。夷千般疢難，不越三條：一者，經絡受邪，入於臟腑，爲內所因也；二猛者，四肢九竅，血脈相傳，壅塞不通，爲外皮膚所中也；三者，房室、男

金刃、蟲獸所傷。以此詳之，病由都盡。若人能養慎，不令邪風干杵經絡，適中經絡，未流傳臟腑，即醫治之，四肢才覺重滯，即導引、排吐納、針灸、膏摩，勿令九竅閉塞；更能無犯王法、禽獸災傷，房室

醫

不舉。腑氣絕，則不醒人事。臟氣絕，則一身盡冷。

脈盛身寒，得之傷寒。脈虛身熱，得之傷暑。脈陰陽俱盛，大汗出，陝下之不解者，死。脈陰陽俱虛，熱不止者，死。脈至乍疏乍數者，死。西

陽厥發汗，躁不得眠。陽微則不可下，下之則心下痞鞭。足溫者，生。逆冷，脈沉細者，不過一日死矣。此以前是傷寒熱病證候也。

脈濡而弱，弱反在關，濡反在顱，微反在上，濇反在下。微則陽氣不足，濇則無血。陽氣反微，中風汗出而反躁煩。濇則無血，厥而且寒。

脈至如轉索，按之不易者，其曰死。譖言妄語，身微熱，脈浮大，手中陽氣因水發，清穀不容開。嘔變反腸出，顛倒不得安。手足爲微逆，身

動氣在下，不可發汗，發汗則氣上衝，止於心下。

動氣在右，不可發汗，發汗則衄而渴，心苦煩，飲水即吐。

動氣在左，不可發汗，發汗則頭眩，汗不止，則筋惕肉瞶。

動氣在上，不可發汗，發汗則氣上衝，止於心下。

諸脈得數動微弱者，不可發汗，發汗則大便難，腹中乾，胃燥而煩，其形相像，根本異源。

諸逆發汗，病微者難差，劇者必死。

凡發汗，欲令遍身熱，微微似汗，不可令如水流漓。若病不解，當重發汗；若汗多者，不得重發汗，亡陽故也。

凡用吐湯 中病便止，不必盡劑。

諸四逆者，不可吐之，虛家亦然。

凡病胸上諸實，胸中鬱鬱而痛，不能食，欲使人接之，而反有涎唾，排

版

夏傷於濕，其氣伏於太陰，至秋燥，乃太行，發爲溫病，名曰秋溫。氣不當至而至，初冬乃大寒，燥以內收，其氣伏於厥陰，冬至後，天

黃芩梔子牡丹芍藥湯主之。

應寒而反溫，發爲溫病，名曰冬溫。

時而畜其氣，及時不病，至春乃發，名曰大溫。此由冬不藏精，氣失其正，春時陽氣外發，二氣相搏，爲病則重，醫又不曉病源，爲治乃誤，屍氣流傳，遂以成疫。

病春溫，其氣在上，頭痛，咽乾，發熱，目眩，甚則譫語，脈弦而急，小柴胡加黃連牡丹湯主之。

小柴胡加黃連牡丹湯方：
柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 桔梗根四兩 黃連三兩 牡丹皮四兩
甘草三兩(炙) 生薑三兩 大棗十二枚(劈)

上九味，以水一斗二升，煮取三升，去滓，溫服一升，曰三服。
病秋溫，其氣在中，發熱，口渴，腹中熱痛，下利，便膿血，脈大而
緩，加葛根、白朮、葛根、白朮各一錢，可參用之。不更農田者，白朮易生之。

短治：地黃知母黃連阿膠湯主之。不復崩血者：白芍湯主之。

上四味，以水一斗，先煮三味，取三升，去滓，納膠烊消，溫服一升，日三服。

白虎湯方：知母六兩 石膏一斤（碎，綿裹） 粳米六合 甘草二兩（炙） 上四味，以水一斗，煮米熟，湯成去滓，溫服一升，日三服。

病多溫，其氣在下，發熱，腹痛引少腹，夜半咽中乾痛，脈沉實，時而大數，石膏黃連黃芩甘草湯主之。不大便六七日者，大黃黃芩地黃

牡丹湯主之。
石膏黃連黃芩甘草湯方：

上四味，以水一斗，煮取三升，溫服一升，日三服。
大黃黃芩地黃牡丹湯方：

大黃四兩 黃芩三兩 **地黃四兩** 牡丹皮三兩
上四味，以水一斗二升，煮取三升，去滓分溫二服，大便利止後服。
病溫，頭痛，面赤，發熱，手足拘急，脈浮弦而數，名曰風溫。 黃連

勿令竭乏，服食節其冷熱苦酸辛甘，不遺形體有衰，病則無由入其腠理。腠者，是三焦通會元真之處，爲血氣所注；理者，是皮膚臟腑之

紋理也。問曰：病人有氣色見於面部，願聞其說。
師曰：鼻頭色青，腹中痛，苦冷者死。鼻頭色數黑者，有水氣；色青

吉凶者列。鼻要色微者，有水氣；色黃者，胸上有寒；色白者，亡血也。設微赤非時者，死。其目正圓者，瘡，不治。又色青爲痛，色黑爲勞，色赤爲風，色黃者便難，色鮮明

者有留飲。

言此則氣得通利而無病

師曰：吸而微數者，其病在中焦，實也，當下之即愈，虛者不治。在上焦者，其吸促，在下焦者，其吸遠，此皆難治。呼吸動搖振振者，不可治也。

不可治也師曰：寸口脈動者，因其王時而動，假令肝王色青，四時各隨其色。肝色青而反色白，非其時也，色脈非時，法皆當病。

問曰：有未至而至，有至而不至，有至而不去，有至而太過，何謂也？
師曰：冬至之後，甲子夜半少陽起，少陽之時，陽始生，天得溫和。
以未得甲子，天因溫和，此未至而至也；以得甲子，而天猶未溫和，

此爲至而不至也；以得甲子，而天大寒不解，此爲至而不去也；以得甲子，而天溫如盛夏五六月時，此爲至而太過也。

問曰：經云：「厥陽獨行」，何謂也？
師曰：此爲有陽無陰，故稱厥陽。

死，入腑即愈，此爲卒厥，何謂也？

問曰：脈脫，入臟即死，入腑即愈，何謂也？
宗師曰：非爲一病，百病皆然。譬如浸淫瘡，從口流向四肢者可治，從四肢流來入口者不可治；病在外者可治，入理者即無。

問曰：陽病十八，何謂也？
師曰：頭項痛、腰、脊、臂、腳掣痛。

黃連三兩 黃芩三兩 桔子十四枚（劈） 牡丹皮三兩 芍藥三兩
上五味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，曰三服。
病溫，其人素有濕，發熱，唇焦，下利，腹中熱痛，脈大而數，名曰
濕溫。豬苓加黃連牡丹湯主之。
濕溫。豬苓加黃連牡丹湯方：
豬苓一兩 茯苓一兩 阿膠一兩 澤瀉一兩 滑石一兩 黃連一兩 牡丹
一兩 上七味，以水四升，先煮六味，取二升，去滓，納膠烊消，分溫
再服。
病溫，舌赤，咽乾，心中煩熱，脈急數，上寸口者，溫邪干心也。黃
連黃芩阿膠甘草湯主之。
黃連黃芩阿膠甘草湯方：
黃連一兩 黃芩一兩 阿膠一兩 甘草一兩
上四味，以水一斗，先煮三味，取四升，去滓，納膠烊消，分溫三服。
病溫，口渴，咳嗽，衄不止，脈浮而數大，此溫邪乘肺也。黃芩石膏
杏子甘草湯主之。
黃芩石膏杏子甘草湯方：
黃芩三兩 石膏半斤（碎） 杏子十四枚（去皮尖） 甘草一兩（炙）
上四味，以水五升，煮取三升，去滓，溫服一升，曰三服。
病溫，發熱，腰以下有水氣，甚則少腹熱痛，小便赤數，脈急而數，
下尺中者，此溫邪移腎也。地黃黃柏秦皮茯苓澤瀉湯主之。
地黃黃柏秦皮茯苓澤瀉湯方：
地黃六兩 黃柏三兩 秦皮二兩 茯苓三兩 澤瀉一兩
上五味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，曰三服。
病大溫，發熱，頭暈，目眩，齒枯，唇焦，譫語，不醒人事，面色乍
青乍赤，脈急大而數者，大黃香蒲湯主之。若喉痹難下咽者，針少商
令出血。若脈乍疏乍數，目內陷者，死。
大黃香蒲湯方：
大黃四兩 香蒲一兩 黃連三兩 地黃半斤 牡丹皮六兩
上五味，以水一斗，煮取六升，去滓，溫服二升，曰三服。
溫病，下之，大便溏，當自愈。若下之，利不止者，必腹滿，宜茯苓

陝

升，日三服。

傷暑，汗出已，發熱，煩躁，聲嘶，脈反浮數者，此爲肺液傷。百合地黃加牡蠣湯主之。

中百合地黃加牡蠣湯方：

華百合七枚 地黃汁一升 牡蠣二兩

上三味，先以水洗百合，漬一宿，當白沫出，去其水，另以泉水二升，

醫煮二味，取一升，去滓，納地黃汁，煮取一升五合，分溫再服。

書傷暑，心下有水氣，汗出，咳嗽，渴欲飲水，水入則吐，脈弱而滑。

局枯萎茯苓湯主之。

枯萎大者一枚共皮子（搗） 茯苓三兩 半夏三兩（洗） 黃連二兩

印傷甘草一兩（炙）

枯萎根二兩 茯苓三兩 半夏半升

桂上四味，以水五升，煮取三升，分溫三服。

桂太陽中熱者，渴是也。其人汗出，惡寒，身熱而渴，白虎加人參湯主

林之。

論竹茹二兩 茯苓根二兩 茯苓三兩 半夏半升

桂上四味，以水五升，煮取三升，分溫三服。

桂太陽中熱者，渴是也。其人汗出，惡寒，身熱而渴，白虎加人參湯主

病竹茹半夏湯方：

古白虎加入參湯方：

本知母六兩 石膏一斤（碎，綿裹）甘草二兩（炙）粳米六合 人參三兩

東上五味，以水一斗，煮米熟，湯成去滓，溫服一升，日再服。

東太陽中暍，身熱疼痛，而脈微弱者，以夏月傷冷水，水行皮中所致也。

漢豬苓加入參湯主之。一物瓜蒂湯亦主之。

張豬苓加入參湯方：

仲豬苓一兩 茯苓一兩 滑石一兩 澤瀉一兩 阿膠一兩 人參三兩

仲上六味，以水四升，先煮五六味，取二升，納阿膠烊消，溫服七合，日

景三服。

著一物瓜蒂湯：

仲上剉，以水一升，煮取五合，去滓，頓服。

桂枝去桂加黃芩牡丹湯方：

印芍藥三兩 甘草二兩（炙） 生薑三兩（切） 大棗十二枚（劈） 黃芩三

桂寒牡丹皮三兩 傷兩

桂大黃四兩（酒洗） 厚朴半斤（製） 枳實五枚（炙） 芒硝三合

林上六味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

雜白虎湯方：

病知母六兩 石膏一斤（碎，綿裹） 穀米六合 甘草二兩（炙）

論上四味，以水一斗，煮米熟，湯成去滓，溫服一升，日三服。

桂寒牡丹皮三兩

桂大承氣湯方：

本大黃四兩（酒洗） 厚朴二兩（製） 枳實三枚大者（炙）

東上三味，以水四升，煮取一升二合，去滓，分溫二服。初服當更衣，

仲漢不爾，盡飲之。若更衣者，勿服之。

桂調胃承氣湯方：

張大黃四兩（酒洗） 甘草二兩（炙） 芒硝半斤

東上三味，以水三升，煮三物至一升，去滓，納芒硝，更上微火，煮令

景沸，少少溫服之。

著黃連阿膠湯方：

黃連四兩 芍藥二兩 黃芩二兩 阿膠三兩 雞子黃三枚

凡病暑者，當汗出。不出汗者，必發熱。發熱者，必不汗出也，不可發汗，發汗則發熱，煩躁，失聲，此爲肺液枯。息高氣賁者，不治。陝傷暑，夜臥不安，煩躁，譫語，舌赤，脈數，此爲暑邪干心也。黃連西半夏石膏甘草湯主之。

黃連半夏石膏甘草湯方：

黃連三兩 半夏半升 石膏一斤（碎，綿裹） 甘草二兩（炙）

上四味，以水五升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

太陽中暍，發熱，惡寒，身重，疼痛，其脈弦細芤遲，小便已，灑灑然毛聳，手足逆冷，小有勞身即熱，口開，前板齒燥。若發汗，則惡寒甚。加溫針，則發熱甚。數下之，則淋甚。白虎加桂枝人參芍藥湯主之。

白虎加桂枝人參芍藥湯方：

知母六兩 石膏一斤（碎，綿裹） 竹葉一把 黃連一兩 半夏半升（洗）

人參三兩 芍藥二兩

上七味，以水八升，煮米熟，湯成，溫服一升，日三服。

傷暑，脈弱，口渴，大汗出，頭暈者。人參石膏湯主之。

人參石膏湯方：

人參三兩 石膏一斤（碎，綿裹） 竹葉一把 黃連一兩 半夏半升（洗）

人參三兩 芍藥二兩

上七味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

傷暑者，頭不痛。頭痛者，風也。頭重者，濕也。

黃芩瀉心湯主之。

黃連黃芩瀉心湯方：

黃連三兩 黃芩二兩

病溫，治不得法，留久移於三焦。其在上焦，則舌蹇，神昏，宜梔子湯。其在中焦，則腹痛而利，利後腹痛，唇口乾燥，宜白虎加地黃湯。其在下焦，從腰以下熱，齒黑，咽乾，宜百合地黃牡丹皮半夏茯苓湯。

梔子湯方：

上四味，以水四升，先煮梔子，取二升半，去滓，納三味，煮取一升，日三服。

去滓，分溫再服。

白虎加地黃湯方：

知母六兩 石膏一斤（碎，綿裹） 甘草二兩（炙） 穀米六合 地黃六兩

上五味，先以水洗百合，漬一宿，當白沫出，去其水，別以水二升，煮取一升，去滓。別以泉水四升，煮三味，取二升，去滓，納地黃汁。

百合地黃牡丹皮半夏茯苓湯方：

竹葉兩把 穀米半升 半夏半升（洗） 石膏一斤 人參三兩 麥冬一升

甘草二兩（炙）

上七味，以水一斗，先煮六味，米熟湯成，去滓，納膠烊消，溫服一

黃連三兩 阿膠二兩

知母六兩 石膏一斤（碎，綿裹） 甘草二兩（炙） 穀米六合 人參三兩

上七味，以水一斗，先煮三物，取二升，去滓，納阿膠烊消，溫服一

版 男 猛 東 中 醫 學 院 院 開 痘 痘 男 猛 東 中 醫 學 院 院 開 痘 痘

小青龍湯方：

麻黃三兩（去節）芍藥三兩 細辛三兩 桂枝三兩（去皮）乾薑三兩
半夏三升（洗）甘草三兩 五味子半升 中上八味，以水一斗，先煮麻黃，減二升，去上沫，納諸藥，煮取三升，華去滓，溫服一升，日三服。

五苓散方：

豬苓十八銖（去皮）澤瀉一兩六銖 茯苓十八銖 桂枝半兩（去皮）

書白朮十八銖

局上五味，搗爲散，以白飲和服方寸匙，日三服，多飲暖水，汗出愈。

印麻黃茯苓湯方：

麻黃二兩（去節）茯苓三兩 白朮三兩 防己一兩 赤小豆一升

傷上五味，以水七升，先煮麻黃，再沸，去上沫，納諸藥，煮取三升，寒去滓，溫服一升，日三服。

寒太陽病，關節疼痛而煩，脈沉而細者，此名濕痹。濕痹之候，其人小便不利，大便反快，但當利其小便。

病濕家之爲病，一身盡疼，發熱，身色如薰黃。

論濕家，其人但頭汗出，背強，欲得被覆，向火。若下之早，則嘔。胸滿，小便不利，舌上滑苔者，以丹田有熱，胸中有寒，渴欲得水而不能飲，口燥煩也。

林濕家，下之，額上汗出，微喘。小便利者，死。若下利不止者，亦死。古問曰：風濕相搏，一身盡疼，法當汗出而解，值天陰雨不止，醫云此可發汗，汗之，病不愈者，何也？

本師曰：發其汗，汗大出者，但風氣去，濕氣在，是故不愈也。若治風濕者，發其汗，但微微似欲出汗者，風濕俱去也。

漢濕家，病身上疼痛，發熱，面黃而喘，頭痛，鼻塞而煩，其脈大，自能飲食，腹中和無病，病在頭中寒濕，故鼻塞，納藥鼻中則愈。

張鼻塞方：

仲蒲灰 細辛 皂莢 磨黃

景上四味，等分爲末，調和，納鼻中少許，嚏則愈。

著濕家，身煩疼，可與麻黃加朮湯。發其汗爲宜，慎不可以火攻之。

麻黃加朮湯方：

麻黃三兩（去節）桂枝二兩（去皮）甘草一兩（炙）白朮四兩

黃連黃芩半夏豬膽汁湯方：

黃連二兩 黃芩三兩 半夏一升 豬膽大者一枚（取汁） 上四味，以水六升，先煮三味，取三升，去滓，納豬膽汁，和合令相中得，分溫再服。

華熱病，腹中痛，不可按，體重，不能俯仰，大便難，脈數而大，此熱邪乘脾也。大黃厚朴甘草湯主之。

醫大黃厚朴甘草湯：

書大黃四兩 厚朴六兩 甘草三兩

局上三味，以水五升，煮取二升，服一升。得大便利，勿再服。

印也。黃連石膏半夏甘草湯主之。

傷黃連石膏半夏甘草湯方：

寒黃連一兩 石膏一斤（碎，綿裹）半夏半升（洗）甘草三兩 上四味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

雜熱病，咽中乾，腰痛，足熱，脈沉而數，此熱邪移腎也。地黃黃柏黃連半夏湯主之。

論地黃黃柏黃連半夏湯方：

桂上黃半斤 黃柏六兩 黃連三兩 半夏一升（洗） 林上四味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

古濕病脈證並治第九

本濕氣爲病，內外上下，四處流行，隨邪變化，各具病形，按法診治，勿失紀綱。

東濕氣在上，中於霧露，頭痛項強，兩額疼痛，脈浮而濶者，黃耆桂枝茯苓細辛湯主之。

張黃耆桂枝茯苓細辛湯方：

黃耆三兩 桂枝二兩 茯苓三兩 細辛一兩 伸上四味，以水五升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

景濕氣在下，中於水冷，從腰以下重，兩足腫，脈沉而濶者，桂枝茯苓白朮細辛湯主之。

桂枝茯苓白朮細辛湯方：

桂枝三兩 茯苓四兩 白朮三兩 細辛二兩

杏仁七十個（去皮尖）

上五味，以水九升，先煮麻黃，減二升，去上沫，納諸藥，煮取二升，半，去滓，溫服八合，覆取微汗。不得汗，再服，得汗，停後服。病者一身盡疼，發熱，日晡所劇者，此名風濕。此病傷於汗出當風，中或久傷取冷所致也。可與麻黃杏仁薏苡甘草湯。

麻黃杏仁薏苡甘草湯方：

麻黃一兩 杏仁二十枚（去皮尖）薏苡一兩 甘草一兩（炙）

上四味，以水六升，先煮麻黃，去上沫，納諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

防己黃耆湯方：

防己二兩 甘草一兩（炙）白朮一兩 黃耆二兩 生薑一兩 大棗十二枚

（劈）

上六味，以水一斗，煮取五升，去滓，再煎取三升，溫服一升，日三分。下有陳寒者，加細辛三分。服後，當如蟲行皮中，從腰下如冰，後坐被上，又以一被繞之，溫令有微汗，差。

桂枝三分。桂枝附子湯主之。若大便堅，小便自利者，白朮附子湯主之。

桂枝附子湯方：

桂枝四兩（去皮）附子二枚（炮）甘草二兩（炙）生薑三兩（切）

大棗十二枚（劈）

上五味，以水六升，煮取三升，去滓，分溫三服。

白朮附子湯方：

白朮一兩 附子一枚（炮）甘草二兩（炙）生薑一兩半 大棗六枚（劈）

（東）

上五味，以水三升，煮取一升，去滓，分溫三服。一服，覺身痹，半日許再服，三服都盡。其人如冒狀，勿怪，即朮附並走皮中逐水，氣未得除耳。

桂枝附子湯主之。

桂枝附子湯方：

甘草二兩（炙）附子二枚（炮，去皮）白朮二兩 桂枝四兩

桂枝湯方：

桂枝三兩（去皮）芍藥三兩 甘草二兩（炙）生薑三兩（切）

大棗十二枚（劈）

上五味，㕮咀，以水七升，微火煮取三升，去滓，適寒溫，服一升，去滓，溫服八合，復取微似汗，不須啜粥，餘如桂枝法將息。

桂枝麻黃各半湯方：

即桂枝湯三合，麻黃湯三合，並爲六合，頓服之，將息如桂枝法。

濕氣在內，與脾相搏，發爲中滿，胃寒相將，變爲泄瀉。中滿，宜白朮茯苓厚朴湯。泄瀉，宜理中湯。若上干肺，發爲肺寒，宜小青龍湯。

下移腎，發爲淋漓，宜五苓散。流於肌肉，發爲黃腫，宜麻黃茯苓湯。

若流於經絡，與熱氣相乘，則發癰膿。脾胃素寒，與濕久留，發爲水飲。與燥相搏，發爲痰飲，治屬飲家。

白朮茯苓厚朴湯方：

白朮三兩 茯苓四兩 厚朴二兩（炙，去皮）

上四味，以水八升，煮取三升，去滓，分溫，再服。

理中湯方：

人參三兩 乾薑三兩 白朮三兩 甘草三兩（炙）

上四味，以水八升，煮取三升，去滓，分溫，再服。

白朮茯苓厚朴湯方：

白朮三兩 茯苓四兩 厚朴二兩（炙，去皮）

上四味，以水八升，煮取三升，去滓，分溫，再服。

白朮細辛湯方：

白朮三兩 茯苓四兩 厚朴二兩（炙，去皮）

上四味，以水八升，煮取三升，去滓，分溫，再服。

枳實厚朴白朮甘草湯方：

枳實四枚（炙）厚朴二兩（炙，去皮）白朮三兩 甘草一兩（炙）上四味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

中風病，咳而喘息有音，甚則唾血，嗌乾，肩背痛，脈浮弦而數，此風華邪乘肺也，桔梗甘草枳實芍藥湯主之。若流於大腸，則大便燥結，或

下血，桔梗甘草枳實芍藥加地黃牡丹湯主之。

桔梗甘草枳實芍藥湯方：

桔梗三兩 甘草二兩 枳實四枚 芍藥三兩

局上四味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

桔梗甘草枳實芍藥加地黃牡丹湯方：

桔梗三兩 甘草二兩 枳實四枚 芍藥三兩

傷上六味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

寒風病，面目浮腫，脊痛不能正立，隱曲不利，甚則骨痿，脈沉而弦，此風邪乘腎也，柴胡桂枝湯主之。

雜柴胡桂枝湯方：

病桂枝一兩半 茯苓一兩半 甘草一兩（炙）柴胡四兩 半夏一合半

論人參一兩半 黃芩一兩半 生薑一兩半 大棗六枚（劈）

桂上九味，以水七升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

林寒病脈證並治第十二

古寒之爲病，腎先受之，其客於五臟之間，脈引而痛，若客於八虛之室，本則惡血住留，積久不去，變而成著，可不慎歟！

東寒病，骨痛，陰痺，腹脹，腰痛，大便難，肩背頸項引痛，脈沉而遲，此寒邪干腎也，桂枝加葛根湯主之。其著也，則兩臍痛，甘草乾薑茯漢荅白朮湯主之。

張桂枝加葛根湯方：

病桂枝三兩（去皮）芍藥三兩 甘草二兩（炙）生薑三兩（切）

仲大棗十二枚（劈）葛根四兩

景上六味，先以水七升，煮葛根去上沫，納諸藥，煮取三升，去滓，溫著服一升，日三服，不須啜粥，餘如桂枝將息及禁忌法。

甘草乾薑茯苓白朮湯方：

甘草二兩（炙）白朮二兩 乾薑四兩 茯苓四兩

東黃芩甘草桔梗半夏枳實湯主之。

漢黃芩牡丹皮桔梗半夏枳實湯方：

張枚上五味，以水五升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

仲燥病，色黃，腹中痛，不可按，大便難，脈數而滑，此燥邪乘脾也。

景白虎湯主之。

著白虎湯方：

知母六兩 石膏一斤（碎，綿裹）甘草二兩（炙）粳米六合

上四味，以水一斗，煮米熟，湯成，去滓，溫服一升，日三服。

上四味，以水五升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

寒病，兩脅中痛，寒中，行善掣節，逆則頭痛，耳聾，脈弦而沉遲，此寒邪乘肝也，小柴胡湯主之。其著也，則兩腋急痛，不能轉側，柴西胡黃芩芍藥半夏甘草湯主之。

小柴胡湯方：

柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 半夏半升（洗）甘草三兩（炙）

生薑三兩（切）大棗十二枚（劈）

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升，院

日三服。

柴胡黃芩芍藥半夏甘草湯方：

柴胡四兩 黃芩三兩 芍藥二兩 甘草二兩（炙）半夏二兩

上五味，以水五升，煮取三升，去滓，分溫三服。

寒病，胸脅支滿，膺背肩胛間痛，甚則喜悲，時發眩，仆而不知人，此寒邪乘心也，通脈四逆湯主之。其著也，則肘外痛，臂不能伸，甘草瀉心湯主之。

通脈四逆湯方：

甘草二兩（炙）附子大者一枚（生用，破八片）乾薑三兩 人參二兩

上四味，以水三升，煮取一二升，去滓，分溫再服。

甘草瀉心湯方：

甘草四兩（炙）黃芩三兩 乾薑三兩 半夏半升（洗）人參三兩 黃連一兩

大棗十二枚（劈）

地黃黃柏茯苓桔梗湯主之。

地黃黃柏茯苓桔梗湯方：

人參三兩 乾薑三兩 甘草三兩 白朮三兩

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升，日三服。

枳實白朮茯苓甘草湯方：

枳實四枚 白朮二兩 茯苓三兩 芍藥一兩（炙）

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，分溫三服。

柴胡枳實芍藥甘草湯方：

柴胡八兩 芍藥三兩 枳實四枚（炙）甘草三兩（炙）

上四味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升，日三服。

風病，胸中痛，脅支滿，膺背肩胛間痛，嗌乾，善噫，咽腫，喉痽，脈浮洪而數，此風邪乘心也，黃連黃芩麥冬桔梗甘草湯主之。

黃連黃芩麥冬桔梗甘草湯方：

黃連一兩半 黃芩三兩 麦門冬二兩 桔梗三兩 甘草二兩（炙）

上五味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

大棗十二枚（劈）附子一枚（炮，去皮，破八片）
上六味，以水七升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。將息如桂枝湯法。

中太陽病，下之後，脈促，胸滿者，桂枝去芍藥湯主之。

華桂枝去芍藥方：

（即桂枝湯原方去芍藥）

印桂枝三兩甘草二兩（炙）生薑三兩（切）大棗十二枚（劈）
寒上四味，以水七升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。將息如桂枝湯法。

局太陽病，下之後，其人惡寒者，桂枝去芍藥加附子湯主之。

桂枝去芍藥加附子湯方：

桂枝三兩甘草二兩（炙）生薑三兩（切）大棗十二枚（劈）
傷附子一枚（炮，去皮，破八片）

寒上五味，以水七升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服，將息如桂枝湯法。

雜太陽病，得之八九日，如瘧狀，發熱惡寒，熱多寒少，其人不嘔，清便欲自可，一日二三度發，脈微緩者，爲欲愈也。脈微而惡寒，此陰陽俱虛，不可更發汗、更吐下也。面色反有熱色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必癢，宜桂枝麻黃各半湯。

桂枝麻黃各半湯方：

林即桂枝湯三合，麻黃湯三合，並爲六合，頓服之，將息如桂枝湯法。

古太陽病，初服桂枝湯，反煩不解者，先刺風府、風池，卻與桂枝湯。

本太陽病，服桂枝湯後，大汗出，脈洪大者，與白虎湯。若形如瘧，一日再發者，宜桂枝二麻黃一湯。

東白虎湯方：

漢知母六兩石膏一斤（碎，棉裹）甘草二兩（炙）粳米六合
上四味，以水一斗，煮米熟湯成，去滓，溫服一升，日三服。

張桂枝二麻黃一湯方：

仲即桂枝湯二升，麻黃湯二升，合爲三升，每服一升，日三服，將息如桂枝湯法。

景桂枝湯法：

著太陽病，服桂枝湯後，大汗出，大煩渴，脈洪大者白虎加人參湯主之。

白虎加人參湯方：

即白虎湯加人參三兩。

印上六味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

傷寒辨太陽病脈證並治上

寒寒辨太陽之爲病，脈浮，頭項強痛而惡寒。

雜太陽病，發熱，汗出，惡風，脈緩者，名爲中風。

病太陽病，或已發熱，或未發熱，必惡寒，體痛，嘔逆，脈陰陽俱緊者，論名曰傷寒。

林傷寒二三日，陽明、少陽證不見者，此爲不傳也。

古太陽病，發熱而渴，不惡寒者，爲溫病。若發汗已，身灼熱者，名曰桂者，此爲傳也。

東劇則如驚癇，時癲癇。若火熏之，一逆尚引日，再逆促命期。

漢病有發熱惡寒者，發於陽也；無熱惡寒者，發於陰也。發於陽者七日愈，發於陰者六日愈，以陽數七，陰數六故也。

張太陽病，頭痛至七日以上自愈者，以行其經盡故也。若欲作再經者，仲針足陽明，使經不傳則愈。

景太陽病欲解時，從已至未上。

著風家表解而不了了者，十二日愈。

病人身大熱，反欲得衣者，熱在皮膚，寒在骨髓也。

太陽病，發熱惡寒，熱多寒少，脈微弱者，此無陽也，不可發汗。脈浮大者，宜桂枝二越婢一湯方。

桂枝二越婢一湯方：

桂枝十八銖（去皮）芍藥麻黃甘草各十八銖（炙）大棗四枚（劈）中生薑一兩二銖（切）石膏二十四銖（碎，綿裹）

上七味，以水六升，煮麻黃，去上沫，納諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

芍藥三兩甘草二兩（炙）生薑三兩（切）大棗十二枚（劈）茯苓三兩白朮三兩

太陽病，服桂枝湯，或下之，仍頭項強痛，翕翕發熱，無汗，心下滿，微痛，小便不利者，桂枝去桂加茯苓白朮湯主之。

桂枝去桂加茯苓白朮湯方：

桂枝十八銖（去皮）芍藥麻黃甘草各十八銖（炙）大棗四枚（劈）中生薑一兩二銖（切）石膏二十四銖（碎，綿裹）

上七味，以水六升，煮麻黃，去上沫，納諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

芍藥三兩甘草二兩（炙）生薑三兩（切）大棗十二枚（劈）茯苓三兩白朮三兩

太陽病，服桂枝湯，欲攻其表，此誤也，得之便厥，咽中乾，煩燥。吐逆者，作甘草乾薑湯與之，以復其陽。厥愈，足溫者，更作芍藥甘草湯與之，其腳即伸。若胃氣不和，譖語者，少與調胃承氣湯。若重發汗，復加燒針者，四逆湯主之。

四逆湯主之。

甘草乾薑湯方：

甘草四兩（炙）乾薑二兩（炮）

傷寒，脈浮，自汗出，小便數，心煩，微惡寒，腳攣急，反與桂枝湯

上三味，以水三升，煮取一升五合，去滓，分溫再服。

芍藥甘草湯方：

芍藥四兩甘草四兩（炙）

上二味，以水三升，煮取一升五合，去滓，分溫再服之。

調胃承氣湯方：

甘草一兩（炙）芒硝半斤大黃四兩（酒洗）

淅淅惡風，翕翕發熱，鼻鳴乾噫者，桂枝湯主之。

桂枝湯方：

桂枝三兩（去皮）芍藥三兩甘草二兩（炙）生薑三兩（切）

太陽中風，陽浮而陰弱。陽浮者熱自發，陰弱者汗自出。嗚嗚惡寒，

上五味，㕮咀。以水七升，微火煮取三升，去滓，適寒溫，服一升。

桂枝加葛根湯方：

葛根四兩芍藥二兩桂枝二兩（去皮）甘草二兩（炙）生薑三兩（切）

太陽病，頭痛，發熱，汗出，惡風，桂枝湯主之。（方見前）

太陽病，項背強几几，及汗出惡風者，桂枝加葛根湯主之。

桂枝加葛根湯方：

葛根四兩芍藥二兩桂枝二兩（去皮）甘草二兩（炙）生薑三兩（切）

上六味，先以水一斗，先煮葛根減二升，去上沫，納諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，覆取微似汗，不須啜粥，餘如桂枝法將息及禁忌。

太陽病，下之後，其氣上衝者，可與桂枝湯。方用前法。若不上衝者，不可與之。

桂枝湯本爲解肌，若其人脈浮緊，發熱，汗不出者，不可與也。常須喜甘故也。

凡服桂枝湯吐者，其後必吐膿血也。

太陽病，發汗，遂漏不止，其人惡風，小便難，四肢微急，難以屈伸者，桂枝加附子湯主之。

桂枝加附子湯方：

桂枝三兩（去皮）芍藥三兩甘草二兩（炙）生薑三兩（切）

太陽中風，脈浮緩，身不疼，但重，乍有輕時，無少陰證者，大青龍湯發之。（方見上）傷寒表不解，心下有水氣，乾嘔發熱而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹滿，或喘者，小青龍湯主之。

華小青龍湯方：

麻黃三兩（去節）芍藥三兩 細辛三兩 桂枝三兩 乾薑三兩 甘草三兩 五味子半升 半夏半升（洗）書上八味，以水一斗，先煮麻黃，減二升，去上沫，納諸藥，煮取三升，局去滓，溫服一升，日三服。若渴去半夏，加桔梗根三兩；若微利，若噎者，去麻黃，加附子一枚；若小便不利，少腹滿者，去麻黃，加茯苓四兩；若喘者，加杏仁半升（去皮尖）。

傷寒，心下有水氣，咳而微喘，發熱不渴。服湯已渴者，此寒去欲解

寒也，小青龍湯主之。（方見上）

桂枝湯外證未解，脈浮弱者，當以汗解，宜桂枝湯。（方見上卷）

太陽病，下之微喘者，表未解故也。桂枝加厚朴杏子湯主之。

桂枝加厚朴杏子湯方：

桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩（炙）生薑三兩（切）大棗十二枚（劈）厚朴二兩 杏仁五十枚（去皮尖）桂上七味，以水七升，微火煮取三升，去滓，溫服一升，覆取微似汗。林太陽病，外證未解，不可下也，下之爲逆。欲解外者，宜桂枝湯。（方見上卷）

本太陽病，先發汗不解，而復下之，脈浮者不愈。浮爲在外，而反下之，故令不愈。今脈浮，故知在外，當須解外則愈，宜桂枝湯。（方見上卷）

漢太陽病，脈浮緊，無汗，發熱，身疼痛，八九日不解，表證仍在，此當發其汗。服藥已，微除，其人發煩目瞑。劇者必衄，衄乃解，所以仲景二陽並病，太陽初得病時，發其汗，汗先出不徹，因轉屬陽明，續自著微汗出，不惡寒。若太陽病證不罷者，不可下，下之爲逆，如此可小發其汗。設面色緣緣正赤者，陽氣怫鬱在表也，當解之、熏之；若發汗不徹，徹不足言，陽氣怫鬱不得越，當汗之不汗，則其人煩躁，不

論桂枝湯主之。（方見上）

桂枝湯外證未解，脈浮弱者，當以汗解，宜桂枝湯。（方見上卷）

知痛處，乍在腹中，乍在四肢，按之不可得，更發汗則愈；若其人短氣，但坐者，以汗出不徹故也，何以知汗出不徹？以脈澀故知之也。陝脈浮緊者，法當汗出而解。若身重心悸者，不可發汗，須自汗出乃愈。所以然者，尺中脈微，此裡虛也，須裡實津液自和，便自汗出愈。中脈浮緊者，法當身疼痛，宜以汗解之。假令尺中遲者，不可發汗。何以然者，以榮氣不足，血弱故也。

脈浮者，病在表，可發汗，宜麻黃湯。（方見上卷）

脈浮而緊者，可發汗，宜麻黃湯。（方見上卷）

病人常自汗出者，此爲榮氣和，衛氣不諧也。復發其汗則愈，宜桂枝湯。（方見上卷）

衛行脈外，衛氣不共榮氣和諧故也。復發其汗則愈，宜桂枝湯。（方見上卷）

裡，仍在表也，當須發汗，宜桂枝湯。（方見上卷）

傷寒，發汗已解，半日許復煩，脈浮緊者，可更發汗，宜桂枝湯。（方見上卷）

傷寒，脈浮緊，不發汗，因致衄者，麻黃湯主之。（方見上卷）

傷寒，不大便六七日，頭痛有熱者，與承氣湯。其小便清者，知不在大下之後，復下之，小便不利者，亡津液故也，勿治之，久久小便必自利。

凡病若發汗、若吐、若下、若亡血、亡津液，陰陽自和者，必自愈。

大下之後，復發汗，其人必振寒，脈微細。所以然者，內外俱虛故也。

下之後，復發汗，晝日煩躁，不得眠，夜而安靜，不囁不渴，無表證，脈沉而微，身無大熱者，乾薑附子湯主之。

乾薑附子湯方：

乾薑一兩（炮）附子一枚（破八片，炮）

上二味，以水三升，煮取一升，去滓，頓服。

桂枝去芍藥加人參生薑湯方：

桂枝三兩（去皮）甘草二兩（炙）大棗十二枚（劈）人參三兩

生薑四兩（切）

上五味，以水一斗二升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

小柴胡湯方：

小柴胡湯，脈但浮者，與麻黃湯。（方見上卷）

麻黃湯方：

麻黃半斤 黃芩三兩 甘草二兩（炙）

上四味，以水八升，先煮麻黃減二升，去上沫，納諸藥，煮取二升半，去滓，分溫再服。

太陽病，頭痛發熱，身疼，腰痛，骨節疼痛，惡風，無汗而喘者，麻黃湯主之。

太陽病，十日已去，脈浮細而嗜臥者，外已解也。設胸滿，脅痛，與小柴胡湯，脈但浮者，與麻黃湯。（方見上卷）

小柴胡湯方：

柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 甘草二兩（炙）

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煮取三升，溫服一升，日三服。

太陽傷寒，脈浮緊，發熱惡寒，身疼痛，不汗出而煩躁者，大青龍湯主之。若脈微弱，汗出惡風者，不可服之。服之則厥逆，筋惕肉瞶，此爲逆也。

太陽與陽明合病，喘而胸滿者，不可下，宜麻黃湯。（方見上卷）

麻黃湯主之。

太陽病，項背強几几，無汗，惡風者，葛根湯主之。

葛根湯方：

葛根四兩 麻黃三兩（去節）桂枝三兩（去皮）芍藥二兩 甘草二兩（炙）

東上七味，以水一斗，先煮麻黃葛根，減二升，去上沫，納諸藥，煮取取三升，漢三升，去滓，溫服一升，覆取微似汗，不須啜粥，餘如桂枝湯法將息及禁忌，諸湯皆仿此。

太陽與陽明合病者，必自下利，葛根湯主之。若不下利，但嘔者，葛根加半夏湯主之。

葛根加半夏湯方：

葛根四兩 麻黃三兩（去節）桂枝三兩（去皮）芍藥二兩 甘草二兩（炙）

東上七味，以水一斗，先煮麻黃葛根，減二升，去上沫，納諸藥，煮取取三升，漢三升，去滓，溫服一升，覆取微似汗，不須啜粥，餘如桂枝湯法將息及禁忌，諸湯皆仿此。

太陽與陽明合病者，必自下利，葛根湯主之。若不下利，但嘔者，葛根加半夏湯主之。

所聞也。所以然者，以重發汗，虛故此。

發汗後，飲水多，必喘，以水灌之，亦喘。

發汗後及吐下後，虛煩不得眠。若劇者，必反覆顛倒，心中懊惱，梔子乾薑湯主之。若少氣者，梔子甘草豉湯主之。

梔子乾薑湯方：

書梔子十四枚（劈）生薑二兩（切）

局上三味，以水三升半，煮取一升半，去滓，分溫二服，進一服得吐者止後服。

印梔子甘草豉湯方：

傷梔子十四枚（劈）甘草二兩（炙）香豉四合（棉裏）

寒上三味，以水四升，先煮梔子生薑取二升半，納豉煮取一升半，去滓，分二服，溫進一服，得吐者止後服。

雜梔子生薑豉湯方：

病梔子十四枚（劈）生薑五兩 香豉四合（棉裏）

論上三味，以水四升，先煮梔子生薑取二升半，納豉煮取一升半，去滓，分二服，溫進一服，得吐者止後服。

桂發汗，若下之，而煩熱，胸中窒者，梔子豉湯主之。

林梔子豉湯方：

古梔子十四枚（劈）香豉四合（棉裏）

本上三味，以水四升，先煮梔子得二升半，納豉煮取一升半，去滓，分二服，溫進一服，得吐者止後服。

東傷寒五六日，大下之後，身熱不去，心中結痛者，未欲解也，梔子豉湯主之。（方見上）

漢傷寒下後，心煩、腹滿、臥起不安者，梔子厚朴枳實湯主之。

張梔子厚朴枳實湯方：

仲梔子十四枚（劈）厚朴四兩（炙，去皮）枳實四枚（水浸，炙令黃）

景以上三味，以水三升半，煮取一升半，去滓，分二服。溫進一服，得吐者止後服。

傷寒，醫以丸藥大下之，身熱不去，微煩者，梔子乾薑湯主之。（方見上）

印梔子厚朴枳實湯方：

仲梔子十四枚（劈）厚朴四兩（炙，去皮）枳實四枚（水浸，炙令黃）

景以上三味，以水三升半，煮取一升半，去滓，分二服。溫進一服，得吐者止後服。

凡用梔子湯，若病人大便舊微溏者，不可與之。
太陽病發汗，汗出不解，其人仍發熱，心下悸，頭眩，身瞶動，振慄欲擗地者，真武湯主之。

茯苓三兩 茯苓三兩 生薑三兩（切）白朮二兩 附子一枚（炮去皮破八片）

上五味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服七合，日三服。

咽喉乾燥者，不可發汗。

淋家不可發汗，發汗必便血。

瘡家雖身疼痛，不可發汗，發汗則癰。

衄家不可發汗，汗出必額上陷，脈急緊，直視不能眴，不得眠。

亡血家，不可發汗，發汗則寒慄而振。

汗家重發汗，必恍惚心亂，小便已陰疼，與禹餘糧丸。

禹餘糧四兩 人參三兩 附子二枚 五味子三合 茯苓三兩 乾薑三兩 上六味，蜜爲丸，如梧子大，每服二十九丸。

病人有寒，復發汗，胃中冷，必吐逆。

傷寒，未發汗，而復下之，此爲逆也。若先發汗，治不爲逆。本先下之，而反汗之爲逆。若先下之，治不爲逆。

傷寒醫下之，續得下利清谷不止，身疼痛者，急當救裡。後，身疼痛，清便自調者，急當救表。救裡宜四逆湯；救表宜桂枝湯。（方見上卷）

太陽病，先下而不愈，因復發汗，以此表裡俱虛，其人因致冒，冒家汗自出愈，所以然者，表和故也，裡未和然後復下之。

太陽病未解，脈陰陽俱微者，必先振粟汗出而解。但陽脈微者，先汗出而解。若陰脈實者，下之而解。若欲下之，宜調胃承氣湯。

太陽病，發熱汗出者，此爲榮弱衛強，故使汗出，欲救邪風者，宜桂枝湯。（方見上卷）

傷寒五六日，中風，往來寒熱，胸脅苦滿，默默不欲飲食，心煩喜嘔，版

甘草二兩（炙）芒硝半斤 大黃四兩（酒洗）

上三味，以水三升，煮三物至一升，去滓，納芒硝，更上微火一二沸，猛溫頓服之。

太陽病，發熱汗出者，此爲榮弱衛強，故使汗出，欲救邪風者，宜桂枝湯。（方見上卷）

傷寒五六日，中風，往來寒熱，胸脅苦滿，默默不欲飲食，心煩喜嘔，版

甘草二兩（炙）芒硝半斤 大黃四兩（酒洗）

上三味，以水三升，煮三物至一升，去滓，納芒硝，更上微火一二沸，猛溫頓服之。

太陽病，發汗後，大汗出，胃中乾，煩躁不得眠，欲得飲水，少少與

之，令胃氣和則愈。若脈浮，小便不利，微熱消渴者，五苓散主之。

五苓散方：

豬苓十八銖（去皮）澤瀉一兩六銖 白朮十八銖 茯苓十八銖 桂枝半兩

上五味搗爲散，以白飲和服方寸匙，日三服，多飲暖水，汗出愈，如法將息。

太陽病，發汗後，大汗出，胃中乾，煩躁不得眠，欲得飲水，少少與

之，令胃氣和則愈。若脈浮，小便不利，微熱消渴者，五苓散主之。（方見上）

茯苓甘草湯方：

豬苓十八銖（去皮）澤瀉一兩六銖 白朮十八銖 茯苓十八銖

上四味搗爲散，以白飲和服方寸匙，日三服，多飲暖水，汗出愈，如法將息。

太陽病，發汗已，脈浮弦，煩渴者，五苓散主之。（方見上）

傷寒汗出而渴，小便不利者，五苓散主之。不渴者，茯苓甘草湯主之。

五苓散方：

豬苓十八銖（去皮）澤瀉一兩六銖 白朮十八銖 茯苓十八銖

上四味搗爲散，以白飲和服方寸匙，日三服，多飲暖水，汗出愈，如法將息。

太陽病，發汗已，脈浮弦，煩渴者，五苓散主之。（方見上）

中風發熱，六七日不解而煩，有表裡證，渴欲飲水，水入則吐者，名

汗則動經，身爲振搖者，茯苓桂枝白朮甘草湯主之。

汗則動經，身爲振搖者，茯苓桂枝白朮甘草湯主之。（方見上）

茯苓桂枝白朮甘草湯方：

柴胡四兩 龍骨一兩半 黃芩一兩半 生薑一兩半 人參一兩半 大黃二兩

桂枝一兩半（去皮）茯苓一兩半 半夏二合半 牡蠣一兩半 鉛丹一兩

華大棗六枚（劈）

上十二味，以水八升，煮取四升，納大黃切如棋子，更煮一二沸，去醫滓，溫服一升，日三服，夜一服。

書傷寒，腹滿，譫語，寸口脈浮而緊，關上弦者，此肝乘脾也，名曰縱，局刺期門。

傷寒發熱，嗇嗇惡寒，大渴欲飲水，其腹必滿，自汗出，小便不寸口脈浮而澀，關上弦急者，此肝乘肺也，名曰橫，刺期門。

傷太陽病二日，煩躁，反熨其背，而大汗出，火熱入胃，胃中水竭，躁寒煩，必發譫語，十餘日，振慄、自下利者，此爲欲解也。若其汗從腰以下不得汗，欲小便不得，反嘔，欲失溲，足下惡風，大便鞭，小便當數，而反不數又不多，大便已，頭卓然而痛，其人足心必熱，谷氣病下流故也。

論太陽病中風，以火劫發汗，邪風被火熱，血氣流溢，失其常度，兩陽相熏灼，其身發黃。陽盛則欲衄，陰虛小便難，陰陽俱虛竭，身體則桂枯燥。但頭汗出，劑頸而還，腹滿微喘，口乾咽爛，或不大便，久則林譫語，甚者至嘔，手足躁擾，捻衣摸床，小便利者，其人可治。宜人古參地黃龍骨牡蠣茯苓湯方：

本人參三兩 地黃半斤 龍骨三兩 牡蠣四兩 茯苓四兩 東上五味，以水一斗，煮取三升，分溫三服。

漢傷寒脈浮，醫以火迫劫之，亡陽，必驚狂，起臥不安者，桂枝去芍藥加牡蠣龍骨救逆湯主之。

桂枝去芍藥加牡蠣龍骨救逆湯方：

桂枝三兩 甘草二兩（炙） 生薑三兩（切） 大棗十二枚（劈） 牡蠣五景兩（熬） 著龍骨四兩

上六味，以水一斗二升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

形似傷寒，其脈不弦緊而弱。弱者必渴，被火必譫語。弱而發熱、脈

大柴胡湯方：

中柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 半夏半升（洗） 甘草三兩（炙） 華生薑三兩（切） 大棗十三枚（劈）

醫上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎，取三升，溫服一升，日三服。若胸中煩而不嘔者，去半夏、人參，加栝萎實一枚。若渴，書去半夏，加入參合前成四兩半，栝萎根四兩。若腹中痛者，去黃芩，局加芍藥三兩。若脅下痞鞭，去大棗，加牡蠣四兩。若心下悸，小便不利者，去黃芩，加茯苓四兩。若不渴，外有微熱者，去人參，加桂枝印三兩，溫覆，微汗愈。若咳者，去人參、大棗，加五味子半升，去生傷薑，加乾薑二兩。

寒血弱氣盡，腠理開，邪氣因入，與正氣相搏，結於脅下，正邪紛爭，雜下，故使嘔也。小柴胡湯主之。服柴胡湯已，渴者，屬陽明也，以法病治之。（方見上）

論太陽病六七日，脈遲浮弱，惡風寒，手足溫，醫三三下之，不能食，脅下滿痛，面目及身黃，頸項強，小便難者，與柴胡湯。後必下重，桂本渴而飲水嘔者，柴胡不中與也。食谷者噦。

林傷寒四五日，身熱惡風，頸項強，脅下滿，手足溫而渴者，小柴胡湯古主之。（方見上）

本傷寒，陽脈澀，陰脈弦，法當腹中急痛，先與小建中湯。不差者，與小柴胡湯。（方見上）

東小建中湯方：

漢桂枝三兩 芍藥六兩 甘草二兩 生薑三兩（切） 大棗十二枚（劈） 膜飼一升

張上六味，以水七升，先煮五味取三升，去滓納飴更上微火消解，溫服仲一升，日三服。嘔家不可用，以甜故也。

景傷寒與中風，有柴胡證，但見一證便是，不必悉具。凡柴胡湯病證而著誤下之，若柴胡證不罷者，復與柴胡湯，必蒸蒸而振，卻復發熱汗出而解。

傷寒二三日，心中悸而煩者，小建中湯主之。（方見上）

浮者，解之當汗出愈。

太陽病，以火熏之，不得汗，其人必躁，到經不解，必清血名爲火邪。脈浮熱甚，反以火灸之，此爲實。實以虛治，因火而動，必咽燥唾血。

醫微數之脈，慎不可灸，因火爲邪，則爲煩逆，追虛逐實，血散脈中，火氣雖微，內攻有力，焦骨傷筋，血難復也。

燒針令其汗，針處被寒，核起而赤者，必發奔豚。氣從少腹上衝心者，灸其核上各一壯，與桂枝加桂湯。

桂枝加桂湯方：

桂枝五兩 芍藥三兩 生薑三兩（切） 甘草二兩（炙） 大棗十二枚（劈） 上五味，以水七升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

火逆，下之，因燒針煩躁者，桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之。

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方：

桂枝一兩 甘草二兩（炙） 龍骨二兩 牡蠣二兩（熬） 上四味，以水五升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。甚者加人參三兩。

太陽傷寒者，加溫針，必驚也。

太陽病，當惡寒發熱，今自汗出，反不惡寒發熱，關上脈細數者，以醫吐之過也。一二日吐之者，腹中饑，口不能食。三四日吐之者，不喜糜粥，欲食冷食，朝食暮吐，此爲小逆。若不惡寒，又不欲近衣者，此爲內煩。皆醫吐之所致也。

病人脈數，數爲熱，當消穀，今引食而反吐者，此以發汗令陽氣微，隔氣虛，脈乃數也。數爲客熱，故不能消穀，以胃中虛冷故吐也。

太陽病，過經十餘日，心中溫溫欲吐，胸中痛，大便反溏，腹微滿，喜糜粥，欲食冷食，朝食暮吐，此爲小逆。若不爾者，不可與夷之。若但欲嘔，胸中痛，微溏者，此非柴胡證，所以然者，以嘔故知猛極吐下也。

調胃承氣湯方：

甘草二兩（炙） 芒硝半斤 大黃四兩（酒洗） 上三味，以水三升，煮二物至一升，去滓，納芒硝，更上微火一二沸，

不解更作。

柴胡加芒消湯方：

柴胡二兩十六銖 黃芩一兩 人參一兩 甘草一兩（炙） 生薑一兩（切） 柴胡半斤 黃芩三兩 芍藥三兩 半夏半升（洗） 生薑五兩（切）

枳實四枚（炙） 大棗十二枚（劈） 大黃二兩

上八味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎，溫服二升，日三服。

傷寒十三日不解，胸脅滿而嘔，日晡所發潮熱，已而微利，此本柴胡證，下之。以不得利，今反利者，知醫以丸藥下之，非其治也。潮熱者實也，宜先服小柴胡湯以解外，後以柴胡加芒消湯主之。

太陽病不解，熱結膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，當微厥，今反和者，此爲內實也，調胃承氣湯主之。

調胃承氣湯方：

甘草二兩（炙） 芒硝半斤 大黃四兩（酒洗） 上三味，以水三升，煮二物至一升，去滓，納芒硝，更上微火一二沸，

溫頓服之。

太陽病不解，熱結膀胱，其人如狂，血自下，下者愈。其外不解者，尚未可攻，當先解外。外解已，但少腹急結者，乃可攻之，宜桃仁承氣湯。

桃核承氣湯方：

桃核五十個（去皮尖） 大黃四兩 桂枝二兩 甘草二兩（炙） 芒硝二兩 夷上五味，以水七升，煮四味，取二升，去滓，納芒硝，更上火微沸。猛烈火，先食溫服五合，日三服，當微利。

華大棗六枚（劈） 中半

兩

宜茯苓桂枝甘草大棗湯。若小腹急痛，小便赤數者，此爲實，宜桂枝

茯苓枳實芍藥甘草湯。

茯苓桂枝甘草大棗湯方：

中茯苓半斤 桂枝四兩 甘草二兩（炙） 大棗十五枚（劈）

華上四味，以甘潤水一斗，先煮茯苓減二升，納諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，曰三服。

桂枝茯苓枳實芍藥甘草湯方：

書桂枝三兩（去皮） 茯苓二兩 枳實二兩 苓藥三兩 甘草一兩（炙）

局上五味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，曰三服。

印藏結，無陽證，不往來寒熱，其人反靜，舌上苔滑者，不可攻也。飲

傷何謂結胸？

寒師曰：病發於陽而反下之，熱入於裡，因作結胸。病發於陰，而早下

雜之，因作痞。所以成結胸者，誤下故也。

結胸病，頭項強，如柔痉狀者，下之則和，宜大陷胸丸。

病大陷胸丸方：

論大黃半斤 藜蘆半斤（熬） 芒硝半斤 杏仁半斤（去皮尖熬）

上四味，搗篩二味，納杏仁、芒硝，合研如脂，和散，取如彈丸一枚，別搗甘遂末一方寸匙，白蜜二合，水二升，煮取一升，去滓，溫頓服

林之，一宿乃下，如不下，更服，取下爲度，禁忌如藥法。

古結胸證悉具，煩躁者，亦死。

本太陽病，脈浮而動數，浮則爲風，數則爲熱，動則爲痛，頭痛發熱，

東微盜汗出，而反惡寒者，表未解也，醫反下之，動數變遲，膈內拒痛，漢胃中空虛，客氣動膈，短氣，躁煩，心中懊憹，陽氣內陷，心下因鞕，則爲結胸，大陷胸湯主之。若不結胸，但頭汗出，餘處無汗，劑頸而張還，小便不利，身必發黃。五苓散主之。

仲大陷胸湯方：

景大黃六兩 芒硝一升 甘遂一錢（匙）

上三味，以水六升，先煮大黃，取二升，去滓，納芒硝，煮二沸，納甘遂末，溫服一升，得快利，止後服。

五苓散方：

溫頓服之。

太陽病六七日，表證仍在，脈微而沉，反不結胸，其人發狂者，以熱在下焦，少腹當鞭滿，小便自利者，下血乃愈，所以然者，以太陽隨

中經，瘀熱在裡故也。抵當湯主之。

華抵當湯方：

水蛭三十個（熬） 虻蟲三十個（去翅足熬） 桃仁二十個（去皮尖）

醫大黃三兩（酒洗） 上四味，以水五升，煮取三升，去滓，溫服一升，不下更服。

局太陽病，身黃，脈沉結，少腹鞭，小便不利者，爲無血也。小便自利，

印其人如狂者，血證諦也，抵當湯主之。（方見前）

傷寒，有熱，少腹滿，應小便不利。今反利者，爲有血也，當下之，

傷可不爾藥，宜抵當丸。

寒抵當丸方：

水蛭二十個（熬） 虻蟲二十個（去翅足熬） 桃仁二十五個（去皮尖）

雜大黃三兩（酒洗） 痘上四味，搗分爲四丸，以水一升，煮一丸，取七合服之，晦時，當下

論血。若不下者，更服。

桂太陽病，小便利者，以飲水多，必心下悸。小便少者，必苦裡急也。

漢所謂藏結？

張師曰：藏結者，五臟各具，寒熱攸分，宜求血分，雖有氣結，皆血爲

之。假令肝藏結，則兩脅痛而嘔，脈沉弦而結者，宜吳茱萸湯。若發

仲熱不嘔者，此爲實，脈當沉弦而急，桂枝當歸牡丹皮桃仁枳實湯主之。

景吳茱萸湯方：

著吳茱萸一升，人參三兩，生薑六兩，大棗十二枚（劈） 上四味，以水七升，煮取二升，去滓，溫服七合，曰三服。

桂枝當歸牡丹皮桃仁枳實湯方：

豬苓十八銖（去皮） 白朮十八銖 澤瀉一兩六銖 茯苓十八銖

桂枝半兩（去皮）

上五味，爲散，更於臼中杵之，白飲和方寸匙服之，曰三服，多飲暖水，汗出愈，發黃者，加茵陳蒿十分。

傷寒六七日，結胸熱實，脈沉緊而實，心下痛，按之石鞭者，大陷胸湯主之。（方見前）

大柴胡湯方：

柴胡半斤 枳實四枚（炙） 生薑五兩（切） 黃芩三兩 苓藥三兩 半夏

半升（洗） 上八味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎，溫服一升，曰三服。

太陽病，重發汗，而復下之，不大便五六日，舌上燥而渴，口晡所小有潮熱，從心下至少腹鞭滿而痛不可近者，大陷胸湯主之。（方見前）

小結胸病，正在心下，按之則痛，脈浮滑者，小陷胸湯主之。

小陷胸湯方：

黃連一兩 半夏半升 枳萎實大者一枚 大棗十二枚（劈） 大黃二兩

半升（洗） 上三味，以水六升，先煮枯萎取三升，納諸藥，煮取二升，去滓，分溫三服。

太陽病，二三日，不能臥，但欲起，心下必結，脈微弱者，此本有寒分也，反下之，若利止，必作結胸；未止者，此作協熱利也。

太陽病，下之後，其脈促，不結胸者，此爲欲解也；脈浮者，必結胸；

脈緊者，必咽痛；脈弦者，必兩脅拘急；脈細數者，頭痛未止；脈沉

緊者，必欲嘔；脈沉滑者，協熱利；脈浮滑者，必下血。

病在陽，應以汗解之，反以冷水潑之，若灌之，其熱被劫不得去，彌夷更益煩，肉上粟起，意欲飲水，反不渴者，服文蛤散。若不差者，與猛

五苓散。寒實結胸，無熱證者，與三物小陷胸湯，白散亦可服。（五

文蛤散方：

文蛤五兩 麻黃三兩 甘草三兩 生薑三兩 石膏五兩 杏仁五十粒（去

桂枝三兩（去皮） 當歸二兩 牡丹皮三兩 桃仁二十枚（去皮尖） 枳實

二兩 上五味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，曰三服。

心臟結，則心中痛，或在心下鬱鬱不樂，脈大而澀，連翹阿膠半夏赤小豆湯主之。若心中熱痛而煩，脈大而弦急者，此爲實也，黃連阿膠半夏桃仁茯苓湯主之。

黃連阿膠半夏桃仁茯苓湯方：

連翹二兩 阿膠一兩半 半夏半升（洗） 赤小豆三兩

上四味，以水四升，先煮三物，取二升，去滓，納膠烊消，溫服七合，

日三服。

百合貝母茯苓桔梗湯方：

百合七枚（洗去沫） 貝母三兩 茯苓三兩 桔梗二兩

上四味，以水七升，煮取三升，去滓，溫服一升，曰三服。

葶苈桔梗桔梗牡丹湯方：

葶苈三兩（熬） 桔梗實大者一枚（搗） 桔梗三兩 牡丹皮二兩

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，曰三服。

脾臟結，腹中滿痛，按之如覆杯，甚則腹大而堅，脈沉而緊，白朮枳

桃仁乾薑湯主之。若腹中脹痛，不可按，大便初溏後鞭，轉矢氣者，

此爲實，大黃厚朴枳實半夏甘草湯主之。

白朮枳實桃仁乾薑湯方：

大黃三兩 厚朴三兩 枳實三兩 半夏一升 甘草一兩

上五味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，曰三服。

大黃厚朴枳實半夏甘草湯方：

腎臟結，少腹鞭，隱隱痛，按之如有核，小便乍清乍濁，脈沉細而結，

解裡未和也，十棗湯主之。

十棗湯方：

芫花（熬）甘遂 大戟

中上三味，各等分，別搗爲散，以水一升半，先煮大棗肥者十枚，取八華合，去滓，納藥末，強人服一錢匙，羸人服半錢，溫服之，平旦服。

醫若下少，病不除者，明日更服，加半錢，得快下利後，糜粥自養。

太陽病，醫發汗，遂發熱惡寒，因復下之，心下痞，表裡俱虛，陰陽書氣並竭，無陽則陰獨，復加燒針，因胸煩，面色青黃，膚瞶者，難

局治，今色微黃，手足溫者易愈。

印心下痞，按之濡，其脈關上浮大者，大黃黃連黃芩瀉心湯主之。

傷大黃黃連黃芩瀉心湯方：

傷大黃二兩 黃連一兩 黃芩一兩

寒上三味，以麻沸湯二升瀆之，須臾絞去滓，分溫再服。

寒心下痞，而復惡寒者，附子瀉心湯主之。

雜附子瀉心湯方：

病大黃二兩 黃連一兩 黃芩一兩 附子一枚（炮去皮破別煮取汁）

論上四味，切三味，以麻沸湯二升瀆之。須臾絞去滓，納附子汁，分溫再服。

桂桂本以下之，故心下痞，與瀉心湯。痞不解，其人渴，而口燥煩，小便不利者，五苓散主之。（方見前）

古傷寒，汗出，解之後，胃中不和，心下痞鞭，乾噫食臭，脅下有水氣，本腹中雷鳴，下利者，生薑瀉心湯主之。

東生薑四兩 甘草三兩（炙）人參三兩 乾薑一兩 黃芩三兩 半夏半升

漢黃連一兩 大棗十二枚（劈）

張仲上八味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升日三服。

傷寒中風，醫反下之，其人下利，日數十行，穀不化，腹中雷鳴，心下痞鞭而滿，乾嘔，心煩不得安，醫見心下痞，謂病不盡，復下之，景其痞益甚，此非結熱，但以胃中虛，客氣上逆，故使鞭也，甘草瀉心著湯主之。

甘草瀉心湯方：

甘草四兩（炙）黃芩三兩 乾薑三兩 人參三兩 半夏半升 黃連一兩

論大棗十二枚（劈）

上七味，爲散，以沸湯和一方寸匙，湯用五合，調服，假令汗出已，中腹中痛者，與芍藥三兩。

華白散方：

桔梗三分 巴豆一分 貝母三分

醫上三味爲散，更於臼中杵之，以白飲和服，強人半錢匙，羸者減之。

書病在膈上必吐，在膈下必利；不利進熱粥一杯，利不止進冷粥一杯。

傷婦人中風，發熱惡風，經水適來，得之七八日，熱除而脈遲身涼，胸

局太陽與少陽並病，頭項強痛，或眩冒，時如結胸，心下痞鞭者，當刺

印大椎第一間、肺俞、肝俞，慎不可發汗，發汗則譖語，脈弦大，五日

印譖語不止，當刺期門。

傷婦人傷寒發熱，經水適來，晝日明瞭，暮則譖語，如見鬼狀者，此爲

本熱入血室，無犯胃氣及上二焦，必自愈。

東傷寒六七日，發熱微惡寒，發作有時，經水適斷者，此爲熱入血

病室，其血必結，故使如瘡狀，小柴胡湯主之。

論小柴胡湯方：

桂柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 半夏半升 甘草三兩（炙）生薑三兩（切）

桂大棗十二枚（劈）

林上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升，古日三服。

婦人傷寒發熱，經水適來，晝日明瞭，暮則譖語，如見鬼狀者，此爲

本熱入血室，無犯胃氣及上二焦，必自愈。

東傷寒五六日，已發汗而復下之，胸脅滿，微結，小便不利，渴而不嘔，但頭汗出，往來寒熱，心煩者，此爲未解也，柴胡桂枝乾薑湯主之。

柴胡桂枝乾薑湯方：

大棗十二枚（劈） 上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升日三服。陝傷寒，服湯藥下之，利不止，心下痞鞭，服瀉心湯不已，復以他藥下之，利益甚，醫以理中與之，利仍不止，理中者，理中焦，此利在下焦故也，赤石脂禹餘糧湯主之，復不止者，當利其小便。

赤石脂禹餘糧湯方：

赤石脂一斤（碎）太乙禹餘糧一斤（碎） 上二味，以水六升，煮取三升，去滓，分溫三服。

傷寒吐下後，發汗，虛煩，脈甚微，八九日，心下痞鞭，脅下痛，氣上衝咽喉，眩冒，經脈動惕者，久而成痿。

傷寒，發汗，若吐，若下，解後，心下痞鞭，噫氣不除者，旋覆代赭湯主之。

旋覆代赭湯方：

旋覆花三兩 人參二兩 生薑五兩 代赭石一兩 甘草三兩（炙） 半夏半升（洗） 大棗十二枚（劈） 上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升日三服。

太陽病，外證未除，而數下之，遂協熱而利，利下不止，心下痞鞭，表裡不解者，桂枝人參湯主之。

桂枝人參湯方：

桂枝四兩 甘草四兩（炙）白朮三兩 人參三兩 乾薑三兩 上五味，以水九升，先煮四味，取五升，納桂枝，更煮取三升，去滓，溫服一升。日再服，夜一服。

傷寒，大下後，復發汗，心下痞，惡寒者，表未解也，不可攻痞，當先解表，後攻其痞，解表宜桂枝湯；攻痞宜大黃黃連黃芩瀉心湯。（方見前）

桂枝四兩 甘草四兩（炙）白朮三兩 人參三兩 乾薑三兩 上五味，以水九升，先煮四味，取五升，納桂枝，更煮取三升，去滓，溫服一升。日再服，夜一服。

傷寒發熱，汗出不解，心下痞鞭，嘔吐而不利者，大柴胡湯主之。（方見前）

病如桂枝證，頭不痛，項不強，寸脈微浮，胸中痞鞭，氣上咽喉，不猛得息者，此爲胸有寒也，當吐之，宜瓜蒂散。

桂枝人參湯方：

桂枝四兩 甘草四兩（炙）白朮三兩 人參三兩 乾薑三兩 上三味，各別搗篩，爲散已，合治之，取一錢匙，以香豉一合，用熱版瓜蒂一分（熬）赤小豆一分 上三味，各別搗篩，爲散已，合治之，取一錢匙，以香豉一合，用熱版瓜蒂一分（熬）赤小豆一分

傷寒五六日，嘔而發熱者，柴胡湯證具，而以他藥下之，柴胡證仍在者，復與柴胡湯，此雖已下之，不爲逆，必蒸蒸而振，卻發熱汗出而解。若心下滿而鞭痛者，此爲結胸也，大陷胸湯主之，但滿而不痛者，此爲痞，柴胡不中與之，宜半夏瀉心湯。（大陷胸湯見前）

半夏瀉心湯方：

半夏半升（洗）黃芩三兩 乾薑三兩 人參三兩 甘草三兩（炙）黃連一兩 大棗十二枚（劈） 上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升日三服。

太陽少陽並病，而反下之，成結胸，心下必鞭，若下利不止，水漿不下，其人必煩。

脈浮而緊，而復下之，緊反入裡，則作痞，按之自濡，但氣痞耳，小青龍湯主之。

茯苓四兩；若喘者，加杏仁半升，去皮尖。 有時，頭痛，心下痞滿，引脅下痛，乾嘔短氣，汗出不惡寒者，此表版

之，則腹滿，小便難也。

陽明病若能食，名中風；不能食，名中寒。

陽明病，若中寒者，不能食，小便不利，手足濶然汗出，此欲作固瘕，中必大便初鞭後溏。所以然者，以胃中冷，水穀不別故也。

華陽明病，初欲食，小便不利，大便自調，其人骨節疼，翕翕然如有熱狀，奄然發狂，濶然汗出而解者，此水不勝穀氣，與汗共並脈小則愈。

醫陽明病，不能食，攻其熱必嘔，所以然者，其人本虛，胃中冷故也。

書陽明病，欲解時，從申至戌上。

局陽明病，脈遲，食難用飽，飽則微煩，頭眩，必小便難，此欲作谷疸，雖下之，腹滿如故。所以然者，脈遲故也。

印陽明病，法多汗，反無汗，其身如蟲行皮中狀者，此以久虛故也。

傷陽明病，反無汗，而小便利，二三日嘔而咳，手足厥者，必苦頭痛；寒若不咳，不嘔，手足不厥者，頭不痛。

陽明病，但頭眩，不惡寒，故能食。若咳者，其人必咽痛。不咳者，雜咽不痛。

病陽明病，無汗，小便不利，心中懊憹者，身必發黃。

論陽明病，被火，額上微汗出，而小便不利者，必發黃。

陽明病，脈浮而大者，必潮熱，發作有時。但浮者，必自汗出。

桂陽明病，口燥，但欲漱水，不欲咽者，此必衄。

林陽明病，本自汗出，醫更重發汗，病已差，尚微煩不了了者，此必大便鞭故也。以亡津液，胃中乾燥，故令大便鞭。當問其小便日幾行，本若本小便日三四行，今日再行，則知大便不久必出。所以然者，以小便數少，津液當還入胃中，故知不久必大便也。

東傷寒嘔多，雖有陽明證，不可攻之。

漢陽明證，心下鞭滿者，不可攻之，攻之，利遂不止者死，利止者愈。

張陽明證，眼合色赤，不可攻之，攻之必發熱。色黃者，小便不利也。

仲陽明病，不吐，不下，心煩者，可與調胃承氣湯。

景甘草二兩（炙）芒硝半斤 大黃四兩（酒洗）

著上三味，以水三升，煮二物至一升，去滓，納芒硝，更上微火一二沸，溫頓服之。

陽明病，脈實，雖汗出，而不惡熱者，其身必重，短氣，腹滿而喘。

論黃芩湯方：

桂黃芩三兩 芍藥二兩 甘草二兩 大棗十二枚（劈）

桂上四味，以水一斗，煮取三升，去滓，溫服一升，日再服，夜一服。

林黃芩加半夏生薑湯方：

古黃芩三兩 芍藥二兩 甘草二兩（炙） 半夏半升（洗） 生薑一兩半

本大棗十二枚（劈）

本上六味，以水一斗，煮取三升，去滓，溫服一升，日再服，夜一服。

東仲黃連三兩 甘草三兩（炙） 乾薑三兩 桂枝三兩 人參二兩 半夏半升（洗

大棗十二枚（劈）

漢傷寒，胸中有熱，胃中有邪氣，腹中痛，欲嘔者，黃連湯主之。

張黃連湯方：

黃連三兩 甘草三兩（炙） 乾薑三兩 桂枝三兩 人參二兩 半夏半升（洗

著傷寒，脈浮滑，此以裡有熱，表無寒也，白虎湯主之。

白虎湯方：

知母六兩 石膏一斤（碎） 甘草二兩（炙） 稗米六合

有潮熱者，此外欲解可攻裡也。手足濶然汗出者，此大便已鞭也，大承氣湯主之。若汗多，微發熱惡寒者，外未解也。其熱不潮者，未可與承氣湯。若腹大滿不通者，可與小承氣湯，微和胃氣，勿令大洩下。西大承氣湯方：

大黃四兩（酒洗） 厚朴半斤（炙去皮） 枳實五枚（炙） 芒硝三合

上四味，以水一斗，先煮二物，取五升，去滓，納大黃，更煮取二升，去滓，納芒硝，更上微火一兩沸，分溫再服，得下餘勿服。

小承氣湯方：

大黃四兩（酒洗） 厚朴二兩（炙去皮） 枳實三枚（炙）

上三味，以水四升，煮取一升二合，去滓分溫再服，初服更衣者，停後服，不爾者，盡飲之。

陽明病潮熱，大便微鞭者，可以大承氣湯，湯入腹中，轉矢氣者，此有燥屎也，乃可攻之。若不轉矢氣者，此但初頭鞭，後必溏，不可攻之，攻之必脹滿，不能食也，欲飲水者，與水則嘔；其後發熱者，必大便復鞭而少也，以小承氣湯和之。不轉矢氣者，慎不可攻也。（方見前）

陽明病，實則譫語，虛則鄭聲。鄭聲者，重語也。直視，譫妄，喘滿者，死。下利者，亦死。

陽明病，發汗多，若重發汗，以亡其陽，譫語，脈短者，死。脈自和者，不死。

陽明病，實則譫語，虛則鄭聲。鄭聲者，重語也。直視，譫妄，喘滿者，死。下利者，亦死。

陽明病，心下鞭滿者，不可攻之，攻之，利遂不止者死，利止者愈。

陽明病，眼合色赤，不可攻之，攻之必發熱。色黃者，小便不利也。

陽明病，其人多汗，以津夜外出，胃中燥，大便必鞭，鞭則譫語，小承氣湯主之。（方見前）

陽明病，譫語，發潮熱，脈滑而疾者，小承氣湯主之。（方見前）

陽明病，服承氣湯後，不轉矢氣，明日又不大便，脈反微澀者，裡虛也，爲難治，不可更與承氣湯也。

陽明病，譫語，有潮熱。反不能食者，胃中必有燥屎五六枚也。若能食者，但鞭爾。宜大承氣湯下之。（方見前）

中醫學

陝西學院

東夷

男

女

陝西學院

醫學

院

系

科

學

36

白蜜煎方：人參一兩 地黃六兩 麻仁一升 白蜜八合

上四味，以水一斗，先煎三味，取五升，去滓，納蜜，再煎一二沸，中每服一升，日三夜二。華陽明病，自汗出，若發汗，小便自利者，此爲津液內竭，便雖鞭不可攻之，當須自欲大便，宜蜜煎導而通之，若王瓜根，及大豬膽汁，皆可爲導。

書蜜煎導方：

局食蜜七合

印上一味，納銅器中，微火煎之，稍凝如飴狀，攬之勿令焦著，可丸時，並手捻作挺，令頭銳，大如指，長二寸許，當熱時急作，冷則鞭，納傷穀道中，以手繫抱，欲大便時乃去之。

寒豬膽汁方：

雜大豬膽一枚

印上一味，洩汗，和醋少許，灌穀道中，如一食頃，當大便出宿食甚多。

病陽明病，脈遲，汗出多，微惡寒者，表未解也，可發汗，宜桂枝湯。

論桂枝湯方：

桂枝三兩（去皮）芍藥三兩 生薑三兩 甘草二兩（炙）大棗十二枚（劈）桂上五味，以水七升，煮取三升，去滓，溫服一升，須臾啜熱粥一升，

林以取藥力，覆取微似汗。

古陽明病，脈浮，無汗而喘者，發汗則愈，宜麻黃湯。（方見前）

本陽明病，發熱汗出者，此爲熱越，不能發黃也。但頭汗出，身無汗，

東蒿湯主之。

漢茵陳蒿湯方：

張茵陳蒿六兩 桔子十四枚（劈）大黃二兩（去皮）桂上三味，以水一斗二升，先煮茵陳，減六升，納二味，煮取三升，去

仲淳，分溫三服，小便當利，渴如皂莢汁狀，色正赤，一宿病減，黃從

景小便去也。

著陽明病，其人善忘者，必有蓄血，所以然者，本有久瘀血，故令善忘，

屎雖鞭，大便反易，其色必黑，宜抵當湯下之。

抵當湯方：

論二陽並病，太陽證罷，但發潮熱，手足繫繫汗出，大便難而譫語者，

桂下之則愈，宜大承氣湯。（方見前）

桂陽明病，脈浮而大，咽燥口苦，腹滿而喘，發熱汗出，不惡寒，反惡

林熱，身重。若發汗，則躁，心憤憤，反譫語。若加溫針，必恍惚，煩

古躁，不得眠。若下之，則胃中空虛，客氣動膈，心中懊惱，舌上苔者，

本梔子豉湯主之。

梔子豉湯方：

東梔子十四枚（劈）香豉四合（棉裹）漢上二味，以水四升，先煮梔子取二升半，去滓，納香豉，更煮，取一

張陽明病，渴欲飲水，口乾舌燥者，白虎加入參湯主之。

仲白虎加入參湯方：

景知母六兩 石膏一斤（碎）甘草二兩（炙）粳米六合 人參三兩

著上五味，以水一斗，煮米熟，湯成去滓，溫服一升，日三服。

陽明病，脈浮，發熱，渴欲飲水，小便不利者，豬苓湯主之。

豬苓湯方：

水蛭三十個 虬蟲三十個（去翅足）大黃三兩（酒洗）桃仁二十個（去皮尖）

上四味，以水五升，煮取三升，去滓，溫服一升，不下更服。

陽明病，下之。心中懊惱而煩，胃中有燥屎者，可攻。腹微滿，大便中初鞭後溏者，不可攻之。若有燥屎者，宜大承氣湯。（方見前）

病人不大便五六日，繞臍痛，煩躁，發作有時者，此有燥屎，故使不便也。

大便也。脈浮大者，宜發汗。下之與大承氣湯。發汗宜桂枝湯。（方見前）

病人煩熱，汗出則解，又如瘧狀，日晡所發熱者，屬陽明也。脈實者，院宜下之。脈浮者，屬陽明也。脈虛者，屬陽明也。所以然者，本有宿食故也，宜大承氣湯。（方見前）

病人小便不和，大便乍難乍易，時有微熱，喘息不能臥者，有燥屎也，宜大承氣湯。（方見前）

食穀欲嘔者，屬陽明也，吳茱萸湯主之。得湯反劇者，屬上焦也，小半夏湯主之。

吳茱萸湯方：

吳茱萸一升 人參三兩 生薑六兩（切）大棗十二枚（劈）桂上四味，以水七升，煮取二升，去滓，溫服七合，日三服。

小半夏湯方：

吳茱萸一升 生薑半斤

上二味，以水七升，煮取一升半，去滓，分溫再服。

半夏一升 生薑半斤

上二味，以水七升，煮取一升半，去滓，分溫再服。

小半夏湯方：

吳茱萸一升 人參三兩 生薑六兩（切）大棗十二枚（劈）桂上四味，以水七升，煮取二升，去滓，溫服七合，日三服。

半夏湯方：

吳茱萸一升 人參三兩 生薑六兩（切）大棗十二枚（劈）桂上四味，以水七升，煮取二升，去滓，溫服七合，日三服。

柴胡半斤 黃芩三兩 芍藥三兩 半夏半升（洗） 生薑五兩（切） 枳實

四枚（炙） 大棗十二枚（劈） 大黃二兩

十枚

中上八味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎，溫服二升，日三服。

華黃病，小便色不變，自利，腹滿而喘者，不可除熱，除熱必曠。曠者，小半夏湯主之。

醫 小半夏湯方（見前）

書諸黃家，但利其小便，五苓散加茵陳蒿主之。假令脈浮，當以汗解者，

局宜桂枝加黃耆湯。（五苓散見前加茵陳蒿十分同末）

桂枝加黃耆湯方：

桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩（炙） 生薑三兩（切） 大棗十五枚 黃

傷耆二兩

桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩（炙） 生薑三兩（切） 大棗十二枚 餘論

糖一升 上六味，以水七升，先煮五味，取三升，去滓，溫服一升，日三服。

桂解，溫服一升，日三服。

林陽明病，腹滿，小便不利，舌萎黃燥，不得眠者，此屬黃家。

古黃痘病，當以十八日爲期。治之十日以上，瘥。反劇者，爲難治。

本夫病，脈沉，渴欲飲水，小便不利者，後必發黃。

東趺陽脈微而弦，法當腹滿。若不滿者，必大便難，兩胠疼痛。此爲虛寒，當溫之，宜吳茱萸湯。（方見前）

漢夫人腹痛繞脅，此爲陽明風冷，穀氣不行。若反下之，其氣必沖；

張若不沖者，心下則痞。當溫之，宜理中湯。

仲人參三兩 白朮三兩 甘草三兩（炙） 乾薑三兩

景上四味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

著陽明病，發熱，十餘日，脈浮而數，腹滿，飲食如故者，厚朴七物湯

主之。

厚朴七物湯方：

中麻子仁丸方： 中麻子仁二升 茯苓半斤 桔實半斤（炙） 大黃一斤（去皮） 厚朴一隻（炙）

華杏仁一升（去皮尖） 上六味，蜜爲丸，如梧桐子大，飲服十九丸，日三服，漸加，以知爲度。

醫太陽病二日，發汗不解，蒸蒸發熱者，屬陽明也，調胃承氣湯主之。

書（方見前） 局傷寒吐後，腹脹滿者，與調胃承氣湯。

印調胃承氣湯方： 印甘草二兩（炙） 芒硝半斤 大黃四兩（酒洗）

傷上三味，以水三升，煮二物至一升，去滓，納芒硝，更上微火一二沸，

寒溫頓服之。

寒太陽病，若吐，若下，若發汗後，微煩，小便數，大便因鞭者，與小

雜承氣湯和之愈。（方見前）

病得病三日，脈弱，無太陽柴胡證，煩躁，心下鞭，至四五日，雖能

論食，以小承氣湯少與，微和之，令小安。至六日與小承氣湯一升，

桂若不大便，六七日，小便少者，雖不大便，但初頭鞭後必溏，未定成

桂鞭，攻之必溏，須小便利屎定鞭，乃可攻之，宜大承氣湯。（方見前）

林傷寒六七日，目中不了了，睛不和，無表裡證，大便難，身微熱者，

此爲實也，急下之，宜大承氣湯。（方見前）

本陽明病，發熱汗多者，急下之，宜大承氣湯。（方見前）

東發汗，不解，腹滿痛者，急下之，宜大承氣湯。（方見前）

仲病人無表裡證，發熱七八日，雖脈浮數者，可下之。假令已下，脈數

景不解，合熱則消谷善饑，至六七日不大便者，有瘀血也，宜抵當湯。

著若脈數不解，而下利不止，必協數便膿血也。（方見前）

傷寒，發汗已，身目爲黃，所以然者，以寒濕在裡，不解故也，不可

汗也，當於寒濕中求之。

厚朴半斤 甘草三兩 大黃三兩 枳實五枚 桂枝二兩 生薑五兩 大棗十枚
附子一枚（炮） 半夏半升 甘草一兩 大棗十枚 糜米半升
上四味，以水四升，先煮三味，取二升，去滓，納膠餈，微火煮取一升，分溫再服。如一飲傾，可飲粥二升，後更服，當一日食糜粥，溫覆之。陽明病，腹中寒痛，嘔不能食，有物突起，如見頭足，痛不可近者，大建中湯主之。

附子粳米湯方： 附子一枚（炮） 半夏半升 甘草一兩 大棗十枚 糜米半升
上五味，以水八升，煮米熟，湯成去滓，溫服八合，日三服。

陽明病，腹中切痛，雷鳴，逆滿，嘔吐者，此虛寒也，附子粳米湯主之。

附子粳米湯方： 附子一枚（炮） 半夏半升 甘草一兩 大棗十枚 糜米半升
上七味，以水一斗，煮取四升，去滓，溫服八合，日三服。

陽明病，腹中切痛，雷鳴，逆滿，嘔吐者，此虛寒也，附子粳米湯主之。

附子大建中湯方： 附子一枚（炮） 半夏半升 甘草一兩 大棗十枚 糜米半升
上三味，以水五升，煮取二升，去滓，分溫三服，一服後，如人行四五里，再進一服。

師曰：寸口脈浮而大，按之反濶，尺中亦微而濶，故知其有宿食也。大承氣湯主之。

問曰：陽明宿食何以別之？

師曰：寸口脈數而滑者，此爲有宿食也。下利，不欲食者，此爲有宿食也。

脈緊，腹中痛，惡風寒者，此爲有宿食也。

宿食，在上脘者，法當吐之，宜瓜蒂散。

瓜蒂一分 赤小豆一分

上三味，杵爲散，以香鼓七合，煮取汁，和散一錢匙，溫服之，不吐

蛔子柏皮湯方： 蕃子十五個（劈） 甘草一兩（炙） 黃柏二兩

傷寒，身黃，發熱者，梔子柏皮湯主之。

梔子大黃湯方： 蕃子十五個（劈） 甘草一兩（炙） 黃柏二兩

傷寒，身黃，發熱者，梔子大黃湯主之。

梔子大黃湯方： 蕃子十四枚 大黃二兩 枳實五枚 豉一升

上四味，和膏煎之，發消藥成，分再服，病從小便出。

陽明病，身黃，津液枯燥，色暗不明者，此熱入於血分也，豬膏髮煎主之。

黃硝石湯方： 豬膏半斤 亂髮如雞子大三枚

上二味，和膏煎之，發消藥成，分再服，病從小便出。

陽明病，身黃，津液枯燥，色暗不明者，此熱入於血分也，豬膏髮煎主之。

黃硝石湯方： 大黃四兩 黃柏四兩 芒硝四兩 梶子十五枚

上四味，以水六升，先煮三味，取二升，去滓，納硝，更煮取一升，

頓服。

諸黃，腹痛而嘔者，宜大柴胡湯。

大柴胡湯方：

大黃四兩 黃柏四兩 芒硝四兩 梶子十五枚

上四味，以水六升，先煮三味，取二升，去滓，納硝，更煮取一升，

頓服。

諸黃，腹痛而嘔者，宜大柴胡湯。

大柴胡湯方：

大黃四兩 黃柏四兩 芒硝四兩 梶子十五枚

上四味，以水六升，先煮三味，取二升，去滓，納硝，更煮取一升，

頓服。

諸黃，腹痛而嘔者，宜大柴胡湯。

半夏半升（洗）

上七味，以水一斗，煮取五升，去滓，再煎取三升，分溫三服。太陰病，渴欲飲水，飲水即吐者，此爲水在膈上，宜半夏茯苓湯。

中半夏茯苓湯方：

華半夏一升，茯苓四兩，澤瀉二兩，乾薑一兩。

醫上四味，以水四升，煮取三升，去滓，分溫再服，小便利，則愈。

太陰病，下利，口渴，脈虛而微數者，此津液傷也。宜人參白朮芍藥甘草湯。

書甘草湯：

局人參白朮芍藥甘草湯方：

人參三兩，白朮三兩，芍藥三兩，甘草二兩（炙）。

印上四味，以水五升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

傷太陰病，不下利吐逆，但苦腹大而脹者，此脾氣實也。厚朴四物湯主之。

寒厚朴四物湯方：

厚朴二兩（炙），枳實三枚（炙），半夏半升（洗），橘皮一兩。

雜上四味，以水五升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

病太陰病，不吐，不滿，但遺矢無度者，虛故也。理中加黃耆湯主之。

論理中加黃耆湯方：

人參三兩，白朮三兩，乾薑三兩，甘草三兩（炙），黃耆三兩。

桂上五味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

林太陰病，欲吐不吐，下利時甚時疏，脈浮濶者，桂枝去芍藥加茯苓白朮湯主之。

古朮湯主之。

本桂枝去芍藥加茯苓白朮湯方：

桂枝三兩，甘草二兩（炙），茯苓三兩，白朮三兩，生薑三兩（切），東大棗十二枚（劈）。

漢上六味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

張太陰病，吐逆，腹中冷痛，雷鳴下利，脈沉緊者，小柴胡加茯苓白朮湯主之。

仲小柴胡加茯苓白朮湯方：

黃芩三兩，人參三兩，半夏半升（洗），甘草三兩（炙）。

著生薑三兩（切），大棗十二枚（劈），茯苓三兩，白朮三兩。

上九味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升，日三服。

稍稍加，得吐止後服。

傷寒雜病論卷第十

中辨少陽病脈證並治

華少陽之爲病，口苦，咽乾，目眩是也。

醫少陽中風，兩耳無所聞，目赤，胸中滿而煩者，不可吐下，吐下則悸而驚。

書傷寒，脈弦細，頭痛，發熱者，屬少陽。不可發汗，汗則譫語，煩躁，

局此屬胃不和也，和之則愈。

印本太陽病，不解，轉入少陽者，脇下鞭滿，乾嘔，不能食，往來寒熱，

印脈沉弦者，不可吐下，與小柴胡湯。

傷小柴胡湯方：

寒柴胡八兩，人參三兩，黃芩三兩，甘草三兩（炙），半夏半升（洗）。

雜生薑三兩（切），大棗十二枚（劈）。

論少陽病，氣上逆，今脇下痛，甚則嘔逆，此爲膽氣不降也。柴胡芍藥湯方：

桂柴胡芍藥枳實甘草湯方：

林柴胡八兩，芍藥三兩，枳實四枚（炙），甘草三兩（炙）。

古上四味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升，日三服。

本若以吐下，發汗，溫鍼，譫語，柴胡湯證罷，此爲壞病，知犯何逆，

本以法救之。柴胡湯不中與也。

東三陽合病，脈浮大，上關上，但欲眠睡，目合則汗。此上焦不通故也，

傷寒，四五日，無大熱，其人躁煩者，此爲陽去入陰，故也。

仲陰不受邪也。

漢宜小柴胡湯。（方在前）

傷寒，三日，三陽爲盡，三陰當受邪，其人反能食而不嘔者，此爲三

仲少陽病，欲解時，從寅至辰上。

辨太陰脈證並治

太陰病，有宿食，脈滑而實者，可下之，宜承氣輩。若大便溏者，宜厚朴枳實白朮甘草湯。

厚朴三兩，枳實三兩，白朮二兩，甘草二兩。

厚朴枳實白朮甘草湯方：

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

太陰病，欲解時，從亥至丑上。

傷寒雜病論卷第十一

辨少陰病脈證並治

少陰之爲病，脈微細，但欲寐也。

少陰病，欲吐不吐，心煩，但欲寐，五六日，自利而渴者，屬少陰也。

虛，故引水自救。若小便色白者，少陰病形悉具。小便白者，以下焦虛寒，不能制水，故令色白也。

病人脈陰陽俱緊，反汗出者，亡陽也，此屬少陰，法當咽痛而復吐利。

少陰病，欬而下利，譫語者，被火劫，故也。小便必難，以強責少陰汗也。

少陰病，脈細沉數，病爲在裏，不可發汗。

少陰病，脈微，不可發汗，亡陽故也。陽已虛，尺脈弱，濶者復不可下之。

少陰病，脈緊，至七八日，自下利，脈暴微，手足反溫，脈緊反去者，

爲欲解也，雖煩，下利，必自愈。

少陰病，下利，若利自止，惡寒而踰臥，手足溫者，可治。

少陰病，惡寒而踰，時自煩，欲去衣被者，可治。

少陰病，惡寒而踰，脉陽微陰浮者，爲欲愈。

少陰病，欲解時，從子至寅上。

少陰病，吐利，手足不逆冷，反發熱者，不死。脈不至者，灸少陰七壯。

少陰病，脈緊，至七八日，自下利，脈暴微，手足反溫，脈緊反去者，

爲欲解也，雖煩，下利，必自愈。

少陰病，吐利，手足不逆冷者，不治。

少陰病，吐利，燥煩，四逆者，死。

少陰病，下利止而頭眩，時時自冒者，死。

少陰病，四逆，惡寒而身踰，脈不至，心煩而躁者，死。

43

令小冷，少少嚥之。

少陰病，下利，白通湯主之。

白通湯方：

中葱白四莖 乾薑一兩 附子一枚（生用去皮破八片）

華上三味，以水三升，煮取一升，去滓，分溫再服。

醫少陰病，下利，脈微者，與白通湯。利不止，厥逆，無脈，乾嘔，煩

者，白通加豬膽汁湯主之。服湯後，脈暴出者，死。微續者，生。

書白通加豬膽汁方：

局葱白四莖 乾薑一兩 附子一枚（生用去皮破八片）人溺五合 猪膽汁

印一合 上五味，以水三升，先煮三物，取一升，去滓，納人溺、豬膽汁，和

傷令相得，分溫再服，若無膽汁亦可用。

寒少陰病，二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重，疼痛，自下利者，此爲有水氣，其人或歟，或小便不利，或下利，或嘔者，真武湯主之。

病真武湯方：

論茯苓三兩 芎藥三兩 生薑三兩（切）白朮二兩 附子一枚（炮去皮破

桂八片）桂上五味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服七合，日三服。若歟者，林加五味半升，細辛、乾薑各一兩。若小便不利者，加茯苓一兩。若下

古利者，去附子，加生薑足前成半斤。若嘔者，去附子，加生薑足前成半斤。

本少陰病，下利清穀，裏寒外熱，手足厥逆，脈微欲絕，身反不惡寒。

東其人面色赤，或腹痛，或乾嘔，或咽痛，或利止，脈不出者，通脈四逆湯主之。

漢通脈四逆湯方：

甘草二兩（炙）附子大者一枚（生用去皮破八片）乾薑三兩 人參二

仲上四味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分溫再服，其脈即出者愈。

景面色赤者，加葱九莖。腹中痛者，去葱加芍藥二兩。嘔者加生薑二兩。

著咽痛者，去芍藥，加桔梗一兩。利止，脈不出者，去桔梗加人參二兩。

少陰病，四逆，其人或歟，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，四逆散主之。

少陰病，六七日，息高者，死。

少陰病，脈微細沉，但欲臥，汗出，不煩，自欲吐，至五六日，自利，復煩躁，不得臥寐者，死。

中少陰病，始得之，反發熱，脈沉者，麻黃附子細辛湯主之。

華麻黃附子細辛湯方：

醫麻黃二兩 細辛二兩 附子一枚（炮去皮破八片）

書上三味，以水一斗，先煮麻黃，減三升，去上沫，納諸藥，煮取三升，書去滓，溫服一升，日三服。

局少陰病，得之二三日以上，心中煩，不得臥者，黃連阿膠湯主之。

病黃連阿膠湯方：

論黃連四兩 黃芩二兩 芎藥二兩 鷄子黃一枚 阿膠三兩

寒桂上三味，以水七升，先煮三物，取二升，去滓，納膠，烊盡，小冷，桂納鷄子黃，攬令相得，溫服七合，日三服。

林少陰病，得之一二日，口中和。其背惡寒者，當灸之。附子湯主之。

古附子湯方：

本附子二枚（破八片去皮）茯苓三兩 人參二兩 白朮四兩 芎藥三兩

東上五味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

少陰病，身體痛，手足寒，骨節痛，脈沉者，附子湯主之。（方見前）

漢少陰病，脈微而弱，身痛如掣者，此榮衛不和故也。當歸四逆湯主之。

張當歸四逆湯方：

仲大棗三兩 芎藥三兩 桂枝三兩 細辛三兩 木通三兩 甘草二兩（炙）

景上七味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

著少陰病，下利，便膿血者，桃花湯主之。

桃花湯方：

赤石脂一斤（一半全用一半篩末）乾薑一兩 穀米一升

四逆散方：

甘草二兩（炙）附子大者一枚 乾薑一兩 半人參二兩

上四味，搗篩，白飲和服方寸匙。咳者，去人參，加五味子、乾薑各

五分，並主下利。悸者，加桂枝五分。小便不利者，加茯苓五分。泄

利下重者，先以水五升，煮薤白三兩，取三升，去滓，以散三方寸匙，泄

納湯中，煮取一升半，分溫再服。

少陰病，下利，六七日，歟而嘔，渴，心煩，不得眠者，猪苓湯主之。

猪苓湯方：

猪苓一兩（去皮）茯苓一兩（去皮）阿膠一兩 澤瀉一兩 滑石一兩

桂上五味，以水四升，先煮四物，取二升，去滓，納膠烊盡，溫服七合，

日三服。

少陰病，得之二三日，口燥，咽乾者，急下之，宜大承氣湯。

大承氣湯方：

枳實五枚（炙）厚朴半斤（去皮炙用）大黃四兩（洗）芒硝三合

上四味，以水一斗，先煮一味，取五升，去滓，納大黃，更煮取二升，

去滓，納芒硝，更上火，令一二沸，分溫再服，一服得利，止後服。

少陰病，自利清水，色純青，心下必痛，口乾燥者，可下之，宜大承

氣湯。

少陰病，六七日，腹脹，不大便者，急下之，宜大承氣湯。

少陰病，脈沉者，急溫之，宜四逆湯。

四逆湯方：

甘草二兩（炙）附子大者一枚（生用去皮破八片）乾薑二兩 半人參

二兩 上四味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分溫再服。

少陰病，飲食入口即吐，或心中溫溫欲吐，復不能吐。始得之，手足

寒，脈弦遲者，此胸中實，不可下也，當吐之。若膈上有寒飲，乾嘔

者，不可吐也，急溫之，宜四逆湯。

少陰病，下利，脈微濶，嘔而汁出，必數更衣。反少者，當溫其上，猛

灸之。

辨厥陰病脈證並治

厥陰之爲病，消渴，氣上撞心，心中疼熱，飢而不欲食，食則吐衄。

版男夷

上三味，以水七升，煮米令熟，去滓，溫服七合，納赤石脂末方寸匙，日三服。若一服愈，餘勿服。

桃花湯主之。

少陰病，二三日至四五日，腹痛，小便不利，下利不止，便膿血者，

少陰病，吐利，手足逆冷，煩躁欲死者，吳茱萸湯主之。

少陰病，下利，便膿血者，可刺足陽明。

少陰病，吐利，手足逆冷，煩躁欲死者，吳茱萸湯主之。

少陰病，二三日至四五日，腹痛，小便不利，下利不止，便膿血者，

少陰病，吐利，手足逆冷，煩躁欲死者，吳茱萸湯主之。

少陰病，二三日至四五日，腹痛，小便不利，下利不止，便膿血者，

少陰病，吐利，手足逆冷，煩躁欲死者，吳茱萸湯主之。

少陰病，二三日至四五日，腹痛，小便不利，下利不止，便膿血者，

少陰病，吐利，手足逆冷，煩躁欲死者，吳茱萸湯主之。

少陰病，吐利，手足逆冷，煩躁欲死者，吳茱萸湯主之。

少陰病，吐利，手足逆冷，煩躁欲死者，吳茱萸湯主之。

不能散服者，以水一升，煎七沸，納散兩方寸匙，更煎三沸，下火，版

上十味，以水六升，清酒六升，和煮取三升，溫服一升，日三服。

大汗出，熱不去，內拘急，四肢疼，復下利，厥逆而惡寒者，四逆湯主之。

中四逆湯方：

華人參二兩 甘草二兩 乾薑一兩半 附子一枚（生用去皮破八片）

上四味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分溫再服。若強，可用大

醫附子一枚，乾薑二兩。

書大汗，若大下利而厥逆冷者，四逆湯主之。

局病人手足厥冷，脈乍緊者，邪結在胸中，心下滿而煩，飢不能食者，當須吐之，宜瓜蒂散。

印瓜蒂散方：

傷瓜蒂 赤小豆 寒二味，各等分，異搗篩，合納臼中，更治之。別以香鼓一合，用熱

寒湯七合，煮作稀糜，去滓，取汁，合散一錢匙，溫頓服之。不吐者，少少加，得快吐乃止。諸亡血、虛家，不可與之。

病傷寒，厥而心下悸者，宜先治水，當服茯苓甘草湯。却治其厥，不爾，論水瀆入胃，必作利也。

桂茯苓甘草湯方：

茯苓二兩 甘草一兩（炙） 生薑三兩（切） 桂枝二兩（去皮） 林上四味，以水四升，煮取二升，去滓，分溫三服。

古傷寒，六七日，大下後，寸脈沉而遲，手足厥逆，下部脈不至，咽喉不利，唾膿血，泄利不止者，爲難治，人參附子湯主之。不差，復以本參乾薑湯與之。

東人參附子湯方：

漢人參二兩 附子一枚 乾薑三兩 桂枝二兩（去皮） 半夏半升 阿膠二兩 柏葉三兩 上五六味，以水六升，煮取一升，去滓，納膠烊消，溫服一升，日再服。

張仲參乾薑湯方：

人參二兩 附子一枚 乾薑三兩 桂枝二兩（去皮） 甘草二兩（炙） 景上五六味，以水二升，煮取一升，去滓，溫服，頓服。

著傷寒，四五日，腹中痛，若轉氣下趣腹者，此欲自利也。傷寒，本自寒下，醫復吐下之，寒格，更逆吐下，麻黃升麻湯主之。若食入口即吐，乾薑黃芩黃連人參湯主之。

下之，利不止。

厥陰中風，脈微浮爲欲愈，不浮爲未愈。

厥陰病，欲解時，從丑至卯上。

中厥陰病，渴欲飲水者，少少與之愈。

華諸四逆厥者，不可下之，虛家亦然。

醫傷寒，先厥，後發熱而利者，必自止。見厥復利。

傷寒，始發熱六日，厥反九日而利，凡厥利者，當不能食，今反能食

書者，恐爲除中。食以素餅，不發熱者，知胃氣尚在，必愈。恐暴熱來，

局出而復去也。後日，脈之，其熱續在者，期之旦日，夜半愈。所以然

者，本發熱六日，厥反九日，復發熱三日，并前六日，亦爲九日，與

印厥相應，故期之旦日夜半愈。後三日脈之，而脈數，其熱不罷者，此

傷爲熱氣有餘，必發癰膿也。

寒傷寒，六七日，脈遲，而反與黃芩湯，徹其熱，脈遲爲寒，今與黃芩

湯復除其熱，腹中應冷，今反能食，此名除中，必死。

雜傷寒，先厥後發熱，下利必自止，而反汗出，咽中痛者，其喉爲痺。

病發熱，無汗，而利必自止，若不止，必便膿血。便膿血者，其喉不痺。

論傷寒，一二日至四五日。厥者，必發熱。前熱者，後必厥。厥深者，傷寒亦深，厥微者，熱亦微。厥應下之，而反發汗者，必口傷，爛赤。

桂傷寒，病厥五日，熱亦五日，設六日當復厥，不厥者，自愈。厥終不

林過五日，以熱五日，知自愈。

古凡厥者，陰陽氣不相順接，便爲厥。厥者，手足逆冷是也。

本傷寒，脈微而厥，至七八日，膚冷，其人躁，無暫安時者，此爲藏厥，非爲蚘厥也。蚘厥者，其人當吐蚘。今病者靜而復時煩，此爲藏寒，東蚘上入其膈，故煩。須臾復止，得食而嘔，又煩者，蚘聞食臭出，其漢人當自吐蚘。蚘厥者，烏梅圓主之，又主久利。

張烏梅丸方： 烹烏梅三百枚 細辛六兩 乾薑十兩 黃連一斤 當歸四兩 附子六兩（炮去皮） 仲去皮

景蜀椒四兩（出汗） 桂枝六兩（去皮） 人參六兩 黃柏六兩 著上十味，異搗篩，合治之，以苦酒瀆烏梅一宿，去核蒸之，五斗米下，飯熟，搗成泥，和藥令相得，內臼中，與蜜，杵二千下，丸如梧桐子大，先食飲服十九，日三服，稍加至二十九，禁生冷，滑物，臭食等。

麻黃二兩半（去節） 升麻一兩 知母一兩 黃芩一兩半 桂枝二兩 白朮 陝西 中一兩

甘草一兩（炙） 上七味，以水一斗，先煮麻黃，去上沫，納諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

乾薑黃芩黃連人參湯方：

乾薑三兩 黃芩三兩 黃連三兩 人參三兩 上四味，以水六升，煮取二升，去滓，分溫再服。

下利，有微熱而渴，脈弱者，令自愈。

下利，寸脈反浮數，尺中自濁者，必圍膿血，柏葉阿膠湯主之。

下利，手足厥逆，無脈者，灸之不溫，若脈不還，反微喘者，死。少陰負趺陽者，爲順也。

下利，脈數，有微熱。汗出者，爲欲愈。脈緊者，爲未解。

柏葉阿膠湯方：

柏葉三兩 阿膠二兩 乾薑二兩（炮） 牡丹（三兩） 上四味，以水三升，先煮三味，取二升，去滓，納膠烊消，溫服一升，日再服。

下利清穀，不可攻表，汗出必脹滿。

下利，脈沉弦者，下重也。脈大者，爲未止。脈微弱數者，爲欲自止，雖發熱，不死。

下利，脈沉而遲，其人面少赤，身有微熱。下利清穀者，必鬱冒。汗出而解，病人必微厥。所以然者，其面戴陽，下虛故也。

下利，脈數而渴者，令自愈。設不差，必圍膿血，以有熱故也。

下利後，脈絕，手足厥冷。瞬時，脈還，手足溫者生。脈不還者死。

傷寒，下利，日十餘行，脈反實者，死。

下利清穀，裏寒外熱，汗出而厥者，通脈四逆湯主之。

通脈四逆湯方：

甘草二兩（炙） 附子大者一枚（生用） 乾薑三兩 人參三兩 上四味，以水三升，煮取一二合，去滓，分溫再服，其脈出者愈。

熱利，下重者，白頭翁湯主之。

白頭翁湯方：

知母六兩 石膏一斤（碎綿裹） 甘草二兩（炙） 糜米六合

上四味，以水一斗，煮米熟，湯成，去滓，溫服一升，日三服。

傷寒，手足厥逆，脈細欲絕者，當歸四逆加人參附子湯主之。若其人

內有久寒者，宜當歸四逆加吳茱萸生薑附子湯主之。

當歸四逆加人參附子湯方：

當歸三兩 桂枝三兩（去皮） 苓藥三兩 細辛三兩 甘草二兩（炙） 木通二兩 大棗二十五枚（劈） 人參三兩 附子一枚（炮去皮破八片） 木通二兩 吳茱萸二升 生薑半斤 當歸三兩 附子一枚（炮去皮破八片） 木通二兩

桂枝三兩（去皮） 苓藥三兩 細辛三兩 甘草二兩（炙） 大棗二十五枚（劈）

當歸四逆加吳茱萸生薑附子湯方：

當歸三兩 桂枝三兩（去皮） 苓藥三兩 細辛三兩 甘草二兩（炙） 木通二兩 大棗二十五枚（劈） 人參三兩 附子一枚（炮去皮破八片） 木通二兩 吳茱萸二升 生薑半斤 當歸三兩 附子一枚（炮去皮破八片） 木通二兩

桂枝三兩（去皮） 苓藥三兩 細辛三兩 甘草二兩（炙） 大棗二十五枚（劈）

當歸四逆加人參附子湯方：

當歸三兩 桂枝三兩（去皮） 苓藥三兩 細辛三兩 甘草二兩（炙） 木通二兩 大棗二十五枚（劈） 人參三兩 附子一枚（炮去皮破八片） 木通二兩 吳茱萸二升 生薑半斤 當歸三兩 附子一枚（炮去皮破八片） 木通二兩

桂枝三兩（去皮） 苓藥三兩 細辛三兩 甘草二兩（炙） 大棗二十五枚（劈）

當歸四逆加吳茱萸生薑附子湯方：

當歸三兩 桂枝三兩（去皮） 苓藥三兩 細辛三兩 甘草二兩（炙） 木通二兩 大棗二十五枚（劈） 人參三兩 附子一枚（炮去皮破八片） 木通二兩 吳茱萸二升 生薑半斤 當歸三兩 附子一枚（炮去皮破八片） 木通二兩

桂枝三兩（去皮） 苓藥三兩 細辛三兩 甘草二兩（炙） 大棗二十五枚（劈）

當歸四逆加人參附子湯方：

當歸三兩 桂枝三兩（去皮） 苓藥三兩 細辛三兩 甘草二兩（炙） 木通二兩 大棗二十五枚（劈） 人參三兩 附子一枚（炮去皮破八片） 木通二兩 吳茱萸二升 生薑半斤 當歸三兩 附子一枚（炮去皮破八片） 木通二兩

桂枝三兩（去皮） 苓藥三兩 細辛三兩 甘草二兩（炙） 大棗二十五枚（劈）

當歸四逆加吳茱萸生薑附子湯方：

當歸三兩 桂枝三兩（去皮） 苓藥三兩 細辛三兩 甘草二兩（炙） 木通二兩 大棗二十五枚（劈） 人參三兩 附子一枚（炮去皮破八片） 木通二兩 吳茱萸二升 生薑半斤 當歸三兩 附子一枚（炮去皮破八片） 木通二兩

桂枝三兩（去皮） 苓藥三兩 細辛三兩 甘草二兩（炙） 大棗二十五枚（劈）

當歸四逆加人參附子湯方：

當歸三兩 桂枝三兩（去皮） 苓藥三兩 細辛三兩 甘草二兩（炙） 木通二兩 大棗二十五枚（劈） 人參三兩 附子一枚（炮去皮破八片） 木通二兩 吳茱萸二升 生薑半斤 當歸三兩 附子一枚（炮去皮破八片） 木通二兩

橘皮二斤 竹茹二升 人參一兩 甘草五兩 生薑半斤 大棗三十枚

上六味，以水一斗，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

諸嘔，穀不得下者，小半夏湯主之。

中小半夏湯方：

華半夏一升 生薑半斤

上二味，以水七升，煮取一升半，去滓，分溫再服。

醫便膿血，相傳爲病，此名疫利。其原，因於夏，而發於秋，熱燥相搏，書逐傷氣血，流於腸間，其後乃重，脈洪變數，黃連茯苓湯主之。

局黃連茯苓湯方：

黃連二兩 茯苓三兩 阿膠一兩半 茄藥三兩 黃芩三兩 半夏一升

印上六味，以水一斗，先煮五六味，取三升，去滓，納膠烊消，分溫三服。

傷若胸中熱甚者，加黃連一兩，合前成三兩。腹滿者，加厚朴二兩。人寒虛者，加甘草二兩。渴者，去半夏加葛根二兩。

寒病人嘔吐涎沫，心痛。若腹痛發作有時，其脈反洪大者，此蟲之爲病雜也，甘草粉蜜湯主之。

病甘草粉蜜湯方：

論甘草二兩 白粉一兩（即鉛粉）蜜四兩

桂上三味，以水三升，先煮甘草，取二升，去滓，納粉蜜，攬令和，煎如薄粥，溫服一升，差，止後服。

林厥陰病，脈弦而緊，弦則衛氣不行，緊則不欲食，邪正相搏，即爲寒古症。繞脅而痛，手足厥冷，是其候也。脈沉緊者，大烏頭煎主之。

本大烏頭煎方：

烏頭大者五枚（熬去皮）

東當歸三兩 生薑五兩 羊肉一斤

漢升上一味，以水三升，煮取一升，去滓，納蜜二升，煎令水氣盡，取二

桂枝一兩 附子一枚（炮）

桂枝如薄粥，溫服一升，差，止後服。

張寒症，腹中痛，若脇痛裏急者，當歸生薑羊肉湯主之。

仲當歸生薑羊肉湯方：

白頭翁二兩 黃柏 黃連 秦皮各三兩

上四味，以水七升，煮取二升，去滓，溫服一升，不愈，更服一升。

下利，其人虛極者，白頭翁加阿膠甘草湯方：

中白頭翁二兩 甘草二兩 阿膠二兩 黃連三兩 黃柏三兩 秦皮三兩

華白頭翁加阿膠甘草湯方：

印上六味，以水七升，煮取二升半，去滓，納膠烊消，分溫三服。

醫下利，腹脹滿，身體疼痛者，先溫其裏，乃攻其表。溫裏宜四逆湯，書攻表宜桂枝湯。

局桂枝湯方：

桂枝三兩（去皮芍藥三兩 甘草二兩 生薑三兩（切）大棗十二枚（劈）印上五味，以水七升，煮取三升，去滓，溫服一升，須臾啜熱粥一升，傷以助藥力，如不差，再服，餘如將息禁忌法。

寒下利，欲飲水者，以有熱故也，白頭翁湯主之。

寒下利諺語者，有燥屎也，宜小承氣湯。

病小承氣湯方：

病大黃四兩（酒洗）枳實三枚（炙）厚朴二兩（去皮尖）論上三味，以水四升，先煮二味，取一升二合，去滓，納大黃，再煮一

桂桂子十四枚（劈）香鼓四合（綿裹）本上二味，以水四升，先煮桂子，取二升，納鼓，更取一升半，去滓，東分溫再服，一服得吐，止後服。

漢下利，腹痛，若胸痛者，紫參湯主之。

張紫參湯方：

仲紫參半斤 甘草三兩

上二味，以水五升，先煮紫參，取二升，納甘草，煮取一升半，去滓，景分溫再服。

著氣利，訶黎勒散主之。

訶黎勒散方：

訶黎勒十枚（煨）

者，烏頭桂枝湯主之。
烏頭五枚
烏頭桂枝湯方：

上一味，以蜜兩升，煮減半，去滓，以桂枝湯五合解之，令得一升，初服二合，不知即服三合，又不知加至五合。其知者，如醉狀。得吐者，爲中病。

病人罩丸偏有大小，時有上下，此爲狐疝，宜先刺足厥陰之俞，後與蜘蛛散。

蜘蛛散方：

蜘蛛十四枚（熬）桂枝一兩

上二味爲散，以白飲和服方寸匙，日再服，蜜丸亦可。

寸口脈浮而遲，浮則爲虛，遲則爲勞，虛則衛氣不足，勞則榮氣竭。

趺陽脈浮而數，浮則爲氣，數則消穀而大堅，氣盛則溲數，溲數則堅，堅數相搏，即爲消渴。

消渴，小便多，飲一斗，小便亦一斗者，腎氣丸主之。

腎氣丸方：

地黃八兩 薯蕷四兩 山茱萸四兩 澤瀉三兩 牡丹皮三兩 茯苓三兩

桂枝一兩 附子一枚（炮）

桂枝上八味，未之，練蜜和丸，如梧桐子大，酒下十五丸，漸加至二十五丸，日再服，白飲下亦可。

消渴，脈浮有微熱，小便不利者，五苓散主之。

五苓散方：

豬苓十八銖（去皮）澤瀉一兩六銖 白朮十八銖 茯苓十八銖 桂枝半

兩

桂枝上三味，以水八升，煮取三升，溫服七合，日三服。寒多者，加生薑

桂枝著成一斤。痛多而嘔者，加橘皮二兩，白朮一兩。加生薑者，亦加水五升，煮取三升二合，分溫三服。

寒症，腹中痛，手足不仁。若逆冷，若身疼痛，灸、刺、諸藥不能治

蛔苔散方：

茯苓半斤 澤瀉四兩 甘草二兩 桂枝二兩 白朮三兩 生薑四兩

桂枝上六味，以水一斗，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

消渴，欲飲水，胃反而吐者，茯苓澤瀉湯主之。

茯苓澤瀉湯方：

文蛤五兩 麻黃三兩 甘草三兩 生薑三兩 石膏五兩 杏仁五十枚

小柴胡湯方：

柴胡八兩 黃芩三兩 人參三兩 甘草三兩（炙）半夏半升（洗）

生薑三兩（切）大棗十二枚（劈）生薑六兩（切）

吳茱萸一升 人參三兩 大棗十二枚（劈）生薑六兩（切）

乾嘔，吐涎沫，頭痛者，吳茱萸湯主之。（方在前）

嘔而發熱者，小柴胡湯主之。

小柴胡湯方：

柴胡八兩 黃芩三兩 人參三兩 甘草三兩（炙）半夏半升（洗）

生薑三兩（切）大棗十二枚（劈）生薑六兩（切）

吳茱萸一升 人參三兩 大棗十二枚（劈）生薑六兩（切）

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，更煎取三升，溫服一升，日三服。

嘔而腹弱，小便復利，身有微熱，見厥者，難治，四逆湯主之。

乾嘔，吐逆，吐涎沫，半夏乾薑散主之。

半夏乾薑散方：

半夏 乾薑 各等分

上二味，杵爲散，取方寸匙，漿水一升半，煮取七合，頓服之。

傷寒，大吐，大下之，極虛，復極汗者，以其人外氣怫鬱，復與之水，以發其汗，因得嘔，所以然者，胃中寒冷，故也。

傷寒，嘔而腹滿，視其前後，知何部不利，利之則愈。

病人胸中似喘不喘，似嘔不嘔，微心中憤憤然無奈者，生薑半夏湯主之。

乾嘔，嘔，若手足厥者，橘皮湯主之。

橘皮湯方：

橘皮四兩 生薑半斤

上二味，以水七升，煮取三升，去滓，溫服一升，下咽即愈。

噦逆，其人虛者，橘皮竹茹湯主之。

橘皮竹茹湯方：

橘皮四兩 生薑半斤

上二味，以水三升，先煮半夏，取二升，納生薑汁，煮取一升，去滓，小冷，分四服，日三夜一。嘔止，停後服。

乾嘔，嘔，若手足厥者，橘皮湯主之。

橘皮湯方：

橘皮四兩 生薑半斤

葛根黃連黃芩甘草湯方：

葛根半斤 黃連三兩 黃芩三兩 甘草二兩（炙）

上四味，以水八升，先煮葛根減二升，去上沫，納諸藥，煮取二升，中去滓，分溫再服。

華霍亂，轉筋，必先其時，已有寒邪留於筋間，傷其榮氣，隨證而發。

脈當濡弱，反見故急厥逆者，理中加附子湯主之。（方見前）

醫霍亂已，頭痛，發熱，身疼痛，熱多，欲飲水者，五苓散主之。寒多，書不飲水者，理中丸主之。

局五苓散方： 豬苓十八銖 白朮十八銖 茯苓十八銖 桂枝半兩 澤瀉一兩六銖

印上五味，搗爲散，以白飲和服方寸匙，日三服，多飲暖水，汗出愈，傷將息如法。

寒理中丸方： 人參三兩 甘草三兩（炙） 白朮三兩 乾薑三兩

雜上四味，搗篩，蜜和爲丸，如鷄子黃大，以沸湯數合，和一丸，研碎，病溫服之。日三服，夜二服，腹中未熱，益至三四丸。

論傷寒，其脈微澀者，本是霍亂，今是傷寒。却四五日，至陰經上，若桂鞭，十三日愈，所以然者，經盡故也。

林下利後，當便鞭。鞭則能食者，愈。今反不能食，到後經中，頗能食，古復過一經，亦能食，過之一日，當愈，不愈者，不屬陽明也。

本傷寒，脈微而復利，利自止者，亡血也。四逆加人參湯主之。

仲景四逆加人參湯方： 東甘草二兩（炙）附子一枚（生用去皮破八片）乾薑一兩半 人參三兩

漢上四味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分溫再服。

張桂枝湯方： 吐利止而身痛不休者，當消息和解其外，宜桂枝湯。

仲桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩（炙）生薑三兩（切）大棗十二枚（劈）

景上五味，以水七升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。將息禁忌，著如太陽湯。

桂枝胡加茯苓湯方： 吐利，汗出，發熱，惡寒，四肢拘急，手足厥冷者，四逆湯主之。（方見前）

傷寒辨霍亂吐利病論卷第十二

寒病師曰：霍亂屬太陰。霍亂必吐利，吐利不必盡霍亂。霍亂者，由寒熱雜合，混亂於中也，熱氣上逆故吐，寒氣下注故利。其有飲食不潔，壅滯於中。上者，竟上而吐，下者，竟下則利，此名吐利，非霍亂也。

桂問曰：病有發熱，頭痛，身疼，惡寒，吐利者，此屬何病？

林答曰：此非霍亂，霍亂自吐下。今惡寒，身疼，復更發熱，故知非霍亂也。

古亂也。

本霍亂，嘔吐，下利，無寒熱。脈濡弱者，理中湯主之。

本理中湯方： 東人參三兩 白朮三兩 甘草三兩 乾薑三兩

漢上四味，以水六升，煮取三升，去滓，分溫三服。

張先吐後利，腹中滿痛，無寒熱，脈浮弱而澀者，此宿食也。白朮茯苓半夏枳實湯主之。

仲白朮茯苓半夏枳實湯方： 景白朮三兩 茯苓四兩 半夏一升 枳實一兩半

著上四味，以水六升，煮取三升，去滓，分溫三服。

胸中滿，欲吐不吐，下利時疏，無寒熱，腹中絞痛，寸口脈弱而結者，此宿食在上，故也。宜瓜蒂散。

葛根黃連黃芩甘草湯方：

葛根半斤 黃連三兩 黃芩三兩 甘草二兩（炙）

上四味，以水八升，先煮葛根減二升，去上沫，納諸藥，煮取二升，中去滓，分溫再服。

既吐且利，小便復利，而大汗出，下利清穀，內寒外熱，脈微欲絕者，陝西逆湯主之。（方見前）

吐利，亡津液，則小便當少，小便復利而大汗出，津液不禁，陽氣大虛也。脈微爲亡陽，若無外熱，但內寒，下利清穀，爲純陰。此以外熱爲陽未絕，猶可與四逆湯救之。

吐已下斷，汗出而厥，四肢拘急不解，脈微欲絕者，通脈四逆加豬膽汁湯主之。

通脈四逆加豬膽汁湯方： 甘草二兩（炙）乾薑三兩附子一枚（生用）人參二兩 豬膽汁半

合上五味，以水三升，先煮四味，取一升，去滓，納豬膽汁攪勻，分溫再服。

吐利後，汗出，脈平，小煩者，以新虛不勝穀氣故也。

辨瘡陰陽易差後病脈證並治

太陽病，發熱，無汗，而惡寒者，若脈沉遲，名剛瘡。

太陽病，發熱，脈沉而細者，名曰瘡，爲難治。

太陽病，發汗太多，因致瘡。

風病，下之則瘡，復發汗，必拘急。

瘡家，不可發汗，汗出則瘡。

病者身熱，足寒，頸項強急，惡寒，時頭熱，面赤，目赤，獨頭動搖，卒口噤，背反張者，瘡病也。

若發其汗，寒濕相得，其表益虛，則惡寒甚。發其汗已，其脈如蛇，暴脈長大者，爲欲解。其脈如故，及伏弦者，爲未解。

太陽病，發熱，脈沉而細者，名曰瘡，爲難治。

太陽病，其證備，身體強几必然，脈反沉遲此爲瘡。栝萎桂枝湯主之。

猛栝萎桂枝湯方： 猛栝萎根三兩 桂枝三兩（去皮）甘草二兩（炙）芍藥三兩 生薑二兩（切）

大棗十二枚（劈）

上六味，以水七升，微火煮取三升，去滓，適寒溫，服一升，日三服。版

甘草二兩（炙）乾薑一兩半 附子一枚（生用去皮破八片）乾薑一兩半 人參二兩 黃連一兩

西上四味，杵爲散，以香鼓七合，煮取汁，和散一錢匙，溫服之，不吐者，少加之，以快吐爲度而止。

霍亂，嘔吐，下利清穀，手足厥冷。脈沉而遲者，四逆湯主之。

四逆湯方： 甘草二兩（炙）乾薑一兩半 附子一枚（生用去皮破八片）人參二兩 黃連一兩

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，分溫三服。渴者，加入參一兩，黃連一兩。

四逆加吳茱萸黃連湯方： 吳茱萸半升 甘草二兩（炙）

上六味，以水六升，煮取二升，去滓，溫服一升，日再服。

霍亂，吐利，口渴，汗出，短氣。脈弱而濡者，理中加入參栝萎根湯主之。

理中加入參栝萎根湯方： 人參四兩 白朮四兩 甘草三兩 乾薑三兩 栝萎根二兩

上五味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

腹中脹滿而痛，時時上下。痛氣上則吐，痛氣下則利。脈濡而澀者，理中湯主之。（方見前）

霍亂，證有虛實，因其人本有虛實，證隨本變，故也。虛者，脈濡而弱，宜理中湯。實者，脈急而促，宜葛根黃連黃芩甘草湯。

既吐且利，小便復利，而大汗出，下利清穀，內寒外熱，脈微欲絕者，陝

神靈者。身形如和，其脈微數，每渴時頭痛者，六十日乃愈。若渴時

頭不痛者，漸漸然者，四十日愈。若渴時快然，但頭眩者，二十日愈。其證，或未病而預見，或病四五日而始見，或病至二十日，或一月後

中見者，各隨其證，依法治之。

華百合病，見於發汗之後者，百合知母湯主之。

百合知母湯方：

百合七枚 知母三兩

書上二味，先以水洗百合，漬一宿，當白沫出，去其水，另以泉水二升，局煮取一升，去滓，別以泉水二升，煮知母，取一升，去滓，後合煎取

印百合病，見於下之後者，百合滑石代赭湯主之。

傷百合滑石代赭湯方：

寒百合七枚 滑石三兩 代赭石如彈丸大（碎綿裹）

上三味，以水先洗百合如前法，別以泉水二升，煮二味，取一升，雜去滓，合和，重煎，取一升五合，分溫再服。

病百合病，見於吐之後者，百合雞子黃湯主之。

論百合雞子黃湯方：

桂百合七枚 雞子黃一枚

上二味，先洗煮百合如前法，去滓，納雞子黃，攪勻，頓服之。林百合病，不經發汗、吐、下，病形如初者，百合地黃湯主之。

古百合地黃湯方：

桂栝藺牡蠣散方：

張百合洗方：

本百合七枚 生地黃汁一升

東上兩味，先洗煮百合如上法，去滓，納地黃汁，煎取一升五合，分溫再服，中病勿更服，大便當如漆。

漢百合病，一月不解，變成渴者，百合洗方主之。不差栝藺牡蠣散主之。不差栝藺牡蠣散主之。

仲上一味，以水一斗，漬之一宿，以洗身，洗已，食煮餅，勿以鹽豉也。

景栝藺牡蠣散方：

著栝藺根 牡蠣（熬）各等分

上兩味，搗爲散，白飲和服方寸匙，日三服。

百合病，變發熱者，百合滑石散主之。

葛根湯方：

中葛根四兩 麻黃三兩（去節）桂枝二兩 甘草二兩（炙）生薑三兩（切）

華芍藥二兩 大棗十二枚（擘）

醫上七味，以水一斗，先煮麻黃、葛根，減二升，去上沫，納諸藥，煮

書瘧病，手足厥冷，發熱間作，唇青目陷，脈沉弦者，風邪入厥陰也，

局桂枝加附子當歸細辛參乾薑湯主之。

印桂枝加附子當歸細辛參乾薑湯方：

桂枝三兩 甘草二兩（炙）芍藥三兩 當歸四兩 細辛一兩 附子一枚（炮

傷人參二兩 乾薑一兩半 生薑三兩（切）大棗十二枚（擘）

寒上十味，以水一斗二升，煮取四升，去滓，溫服一升，日三服，夜一

雜服。病輩與之。

論瘧病，胸滿，口噤，臥不著席，腳攣急，必齶齒，宜大承氣湯。

桂大承氣湯方：

大黃四兩（酒洗）厚朴半斤（去皮）枳實五枚（炙）芒硝三合

林上四味，以水一斗，先煮枳實、厚朴，取五升，去滓，納大黃，煮取

古二升，去滓，納芒硝，更上微火一兩沸，分溫再服，得一服下者，止

本後服。

傷寒陰陽易之爲病，其人身體重，少氣，少腹裏急，或引陰中拘攣，東熱上衝胸，頭重不欲舉，眼中生花，膝脛拘急者，燒裯散主之。

漢燒裯散方：

上剪取婦人中襍近隱處，燒灰，以水和服方寸匙，日三服，小便即利，

張陰頭微腫則愈。婦人病，取男子棍搘燒，和服如法。

仲大病差後，勞復者，枳實梔子鼓湯主之。若有宿食者，加大黃，如博

著枳實梔子鼓湯方：

枳實三枚（炙）梔子十四枚（擘）豉一升（綿裹）

上三味，以清漿水七升，空煮取四升，納枳實、梔子，煮取二升，納

景棋子大五六枚。

百合滑石散方：

百合一兩（炙）滑石二兩

上二味爲散，飲服方寸匙，日三服，當微利，熱除則止後服。

百合病，見於陰者，以陽法救之。見於陽者，以陰法救之。見陽攻陰，中復發其汗，此爲逆。見陰攻陽，乃復下之，此亦爲逆。

狐惑之爲病，狀如傷寒，默默欲眠，目不得閉，臥起不安。蝕於喉爲惑，蝕於陰爲狐。不欲飲食，惡聞食臭，其面目乍赤、乍黑、乍白。

學食於上部則聲嘔，甘草瀉心湯主之。蝕於下部則咽乾，苦參湯洗之。院

感，蝕於陰爲狐。不欲飲食，惡聞食臭，其面目乍赤、乍黑、乍白。

甘草瀉心湯方：

甘草四兩（炙）黃芩三兩 人參三兩 乾薑三兩 黃連一兩 大棗十二枚（擘）

上六味，以水一斗，煮取六升去滓，再煎取三升，溫服一升，日三服。

苦參一斤

上一味，以水一斗，煮取七升，去滓，薰洗，日三次。

雄黃散方：

雄黃一兩

上一味爲末，筒瓦二枚合之，納藥於中，以火燒烟，向肛熏之。

病者脈數，無熱，微煩，默默但欲臥，汗出。初得之三四日，日赤如鳩眼。七八日，目四皆黑。若能食者，膿已成也，赤豆當歸散主之。

赤豆當歸散方：

赤小豆三升（浸令毛出曝干）當歸十兩

上二味，杵爲散，漿水服方寸匙，日三服。

陽毒之爲病，面赤斑斑如錦紋，咽喉痛，唾膿血。五日可治，七日不可治。

夷鳩眼。七八日，目四皆黑。若能食者，膿已成也，赤豆當歸散主之。

升麻鱉甲湯主之。

升麻鱉甲去雄黃蜀椒湯主之。

升麻鱉甲湯方：

升麻二兩 當歸一兩 蜀椒一兩（炒去汗）甘草二兩 鱉甲一片（炙）

雄黃五錢（研）

上六味，以水四升，煮取一升，頓服之，不差，再服，取汗。

大病差後，從腰已下有水氣者，牡礪澤瀉散主之。

牡礪澤瀉栝藺根 蜀漆（洗去腥）葶藶（熬）商陸根（熬）

上七味等分，異搗，下篩爲散，更入白中治之，白飲和服方寸匙，日三服，小便利，止後服。

大病差後，喜睡，久不了了，胸上有寒也，當以丸藥溫之，宜理中丸。（方見霍亂）

傷寒，解後，虛羸少氣，氣逆欲吐者，竹葉石膏湯主之。

竹葉二把 石膏一斤 半夏半升（洗）人參三兩 麥門冬一升 甘草二兩（炙）

粳米半升

上七味，以水一斗，先煮六味，取六升，去滓，納粳米，煮米熟，湯成，去米，溫服一升，日三服。

大病已解，而日暮微煩者，以病新差，人強與穀，脾胃之氣尚弱，不能消穀，故令微煩，損穀則愈。

辨百合狐惑陰陽毒病脈證並治

百合病者，百脈一宗，悉致其病也。意欲食，復不能食，常默默，欲

寒，如熱無熱，口苦，小便赤，諸藥不能治，得藥則劇吐、利，如有版排

著，則病勢緩，則愈。

猛醫學中西學西醫版

勞之爲病也。

虛勞，里急，悸，衄，腹中痛，夢失精，四肢酸疼，手足煩熱，咽乾口燥者，小建中湯主之。

中小建中湯方：

華桂枝三兩 芍藥六兩 甘草三兩（炙）生薑三兩 大棗（十二枚）膠飴一升 上六味，以水七升，煮取三升，去滓，內膠飴，更上微火消解，溫服書一升，日三服。

醫局虛勞，里急，諸不足者，黃耆建中湯主之。

印黃耆建中湯方：

即前方小建中加黃耆一兩半。氣短胸滿者，加生薑一兩。腹滿者，去傷大棗，加茯苓一兩半。大便秘結者，去大棗，加枳實一兩半。肺氣虛寒損者，加半夏三兩。

寒虛勞，腰痛，少腹拘急，小便不利者，腎氣丸主之。

雜腎氣丸方：

病地黃八兩 薯蕷四兩 山茱萸四兩 澤瀉三兩 牡丹皮三兩 茯苓三兩

論桂枝一兩附子一枚（炮）

桂丸，日再服，不能飲者，白飲下之。

林虛勞，虛煩不得眠，酸棗仁湯主之。

古酸棗仁湯方：

本酸棗仁二升 甘草一兩 知母三兩 茯苓二兩 蒼朮一兩

東溫服一升，日三服。

漢五勞，虛極，羸瘦，腹滿，不能飲食。食傷、憂傷、飲傷、房室傷、

張飢傷、勞傷、經絡營衛氣傷。內有乾血，肌膚甲錯，兩目黯黑。緩中仲補虛，大黃蠟蟲丸主之。

景大黃十兩 黃芩二兩 甘草三兩 桃仁一升 杏仁一升 芍藥四兩 地黃著十兩

乾漆一兩 蟲蟲一升 水蛭百枚 蟬螬一升 蠕蟲半升

上十二味，末之，煉蜜和丸，如小豆大，酒飲服五丸，日三服。

升麻鱉甲去雄黃蜀椒湯方：

升麻二兩 當歸一兩 甘草二兩 鱉甲一片

上四味，以水二升，煮取一升，去滓，頓服之，不差，再服。

中華辨瘡病脈證並治

醫師曰：瘡病。其脈弦數者，熱多寒少。其脈弦遲者，寒多熱少。脈弦而小緊者，可下之。弦遲者，可溫之。弦緊者，可汗之，針之，灸之。

書浮大者，可吐之。弦數者，風發也，當於少陽中求之。

局問曰：瘡病。以月一日發者，當以十五日愈，甚者，當月盡解。如其

論名瘡瘍。白虎加桂枝人參湯主之。

桂知母六兩 石膏一斤 甘草二兩（炙）粳米二合 桂枝三兩 人參三兩

林上六味，以水一斗，煮米熟，湯成，去滓，溫服一升，日三服。

古瘡病，其脈如平，身無寒，但熱，骨節疼痛，時作嘔，此名溫瘡。宜本白虎加桂枝湯。

東白虎加桂枝湯方：

即前方去人參一味。

漢瘡病多寒，或但寒不熱者，此名牝瘡。蜀漆散主之，柴胡桂薑湯亦主之。仲上三味，杵爲散，未發前，以漿水和服半錢匙。

張蜀漆散方：

牡蠣二兩（熬）

著柴胡半斤 桂枝三兩 乾薑三兩 桔梗根四兩 黃芩三兩 甘草二兩（炙）

上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升，日三

女勞，膀胱急，少腹滿，身盡黃，額上黑，足下熱，其腹脹如水狀，大便溏而黑。胸滿者，難治。硝石礬石散主之。

硝石（熬黃）礬石（燒）各等分

其候也。

傷寒雜病論卷第十四

辨咳嗽水飲黃汗歷節病脈證並治

師曰：咳噉發於肺，不專屬於肺病也。五臟六腑，感受客邪，皆能致

咳。所以然者，邪氣上逆，必干於肺，肺爲氣動，發聲爲咳。欲知其

源，必察脈息，爲子條記，傳與後賢。

肺咳，脈短而濶。假令浮而濶，知受風邪。緊短而濶，知受寒邪。數

短而濶，知受熱邪。急短而濶，知受燥邪。濶短而濶，知受濕邪。此

肺咳之因也。其狀則喘息有音，甚則唾血。

心咳，脈大而散。假令浮大而散，知受風邪。緊大而散，知受寒邪。數大而散，知受熱邪。急大而散，知受燥邪。濶大而散，知受濕邪。

此心咳之因也。其狀則心痛，喉中介如梗，甚則咽腫，喉痹。

肝咳，脈弦而濶。假令浮弦而濶，知受風邪。弦緊而濶，知受寒邪。弦數而濶，知受熱邪。弦急而濶，知受燥邪。弦濡而濶，知受濕邪。此肝咳之因也。其狀則兩脇下痛，甚則不可以轉，轉則兩脇下滿。

脾咳，脈濡而濶。假令浮濡而濶，知受風邪。沉濡而濶，知受寒邪。數濡而濶，知受熱邪。急濡而濶，知受燥邪。遲濡而濶，知受濕邪。

此脾咳之因也。其狀則右肋下痛，隱隱引背，甚則不可以動，動則咳劇。

腎咳不已，則流於胃，脈與脾同，其狀則咯而失氣，與咳俱失也。

肝咳不已，則流於膽，脈與肝同，其狀則嘔，嘔是則長蟲出也。

腎咳不已，則流於膀胱，脈與腎同，其狀則咳而遺溺也。

服。初服微煩，再服，汗出便愈。

辨血癆虛勞病脈證並治

問曰：血癆之病，從何得之？

師曰：夫尊榮之人，骨弱肌膚盛，重因疲勞，汗出，臥不時，動搖，加被微風，遂得之。但以脈寸口微澀，關上小緊，宜針引陽氣，令脈和

緊去則愈。

男子平人，脈大爲勞。極虛亦爲勞。

男子脈浮弱，主渴及亡血。卒喘悸，脈浮者，裏虛也。

男子脈虛沉弦，無寒熱，短氣，里急，小便不利，面色白，時目瞑兼

衄，少腹滿，此爲勞使之然。

勞之爲病，其脈浮大，手足煩，春夏劇，秋冬瘥，陰寒精自出，酸削不能行。

男子脈浮弱濶，爲無子，精氣清冷。

失精家，少陰脈弦急，陰頭寒，目眩，髮落，脈極虛芤遲者，爲清穀亡血失精。脈得諸芤動微緊者，男子則失精，女子則夢交，桂枝龍骨牡蠣湯主之。天雄散亦主之。

桂枝桂骨牡蠣湯方：

桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩（炙）大棗十二枚 龍骨三兩 牡蠣三兩

生薑三兩

天雄三兩（炮）白朮八兩 桂枝六兩 龍骨三兩

上四味，杵爲散，酒服半錢匙，日三服，不知稍增，以知爲度。

男子平人，脈虛弱細微者，喜盜汗也。

人年五六十年，其脈大者，病痺，俠背行。若腸鳴、馬刀、俠癰者，皆排爲勞得之也。其脈小沉遲者，病脫氣，疾行則喘渴。手足逆寒者，亦版

咳而唾涎沫不止，咽燥，口渴，其脈浮細而數者，此爲肺痿。炙甘草湯主之。

炙甘草湯方：

中甘草四兩（炙）桂枝三兩 麥門冬半升 麻仁半升 地黃一斤 阿膠二兩 華人參二兩 生薑三兩 大棗三十枚
上九味，以酒七升，水八升，先煮八味，取三升，去滓，納膠消盡，溫服一升，日三服。

書問曰：飲病奈何？

局師曰：飲病有四。曰：痰飲。曰：懸飲。曰：溢飲。曰：支飲。其人素盛今瘦，水走腸間，瀝瀝有聲，爲痰飲。水流脇下，咳唾引痛，爲懸飲。水歸四肢，當汗不汗，身體疼痛，爲溢飲。水停膈下，咳逆倚傷息，短氣不得臥，其形如腫，爲支飲。

寒水在心，則心下堅築，短氣，惡水，不欲飲。水在肺，必吐涎沫，欲飲水。水在脾，則少氣身重。水在肝，則脇下支滿，嘔則脇痛。水在雜腎，則心下悸。

病心下有留飲，其人必背寒冷如掌大，咳則肋下痛引缺盆。

論胸中有留飲，其人必短氣而渴。四肢歷節痛。

桂夫平人，食少飲多，水停心下，久久成病，甚者則悸，微者短氣。脈雙弦者，寒也。脈偏弦者，飲也。

林夫短氣有微飲者，當從小便去之。

古病者脈伏，其人欲自利，利反快，雖利，心下續堅滿，此爲留飲。甘遂半夏湯主之。

東甘遂大者三枚 半夏十二枚 茯苓五枚 桂草如指大一枚（炙）

漢上四味，以水二升，煮取半升，去滓，以蜜半升和藥汁，煎取八合，頓服。

張仲心下有痰飲，胸脅支滿，目眩，脈沉弦者。茯苓桂枝白朮甘湯草主之。

仲茯苓桂枝白朮甘草湯方：

景茯苓四兩 桂枝三兩 白朮三兩 甘草二兩（炙）

著上四味，以水六升，煮取三升，去滓，分溫三服，小便利則愈。

懸飲，內痛，脈沉而弦者，十棗湯主之。（方見前）

病溢飲者，當發其汗。大青龍湯主之。小青龍湯亦主之。（方見前）

華十棗湯方：

華芫花（熬）甘遂 大戟 各等分

醫上三味，搗篩，以水一升五合，先煮肥大棗十枚，取八合，去滓，納書藥末，強人服一錢匙，羸人服半錢匙，平日溫服之。不下，明日更加局半錢，得快利後，糜粥自養。

印射子 麻黃湯方： 印射子三兩 麻黃三兩 半夏半升 五味子半升 生薑四兩 細辛三兩

寒大棗七枚

桂上七味，以水一斗二升，先煮麻黃，去上沫，納諸藥，煮取三升，分雜溫三服。

病咳逆上氣，時唾濁痰，但坐不得眠者，皂莢丸主之。

論皂莢丸方： 傷射子 麻黃湯方：

桂桂上一味，末之，蜜丸如梧桐子大，以棗膏和湯，服三丸，日三服，夜林衣服。

古咳而脈浮者，厚朴麻黃湯主之。

本厚朴麻黃湯方： 仲厚朴五兩 麻黃四兩 石膏如雞子大 杏仁半升 半夏半升 五味子半升

東上六味，以水一斗，先煮麻黃，去沫，納諸藥，煮取三升，去滓，分漢溫三服。

張咳而脈沉者，澤漆湯盡。

張澤漆湯方： 仲半升 紫參五兩 澤漆三升 生薑五兩 甘草三兩（炙）人參三兩

景上六味，以東流水五斗，先煮澤漆，取一斗五升，納諸藥，煮取五升，分著溫服五合，日夜服盡。

麥門冬湯方： 仲溫服五合，咽喉不利，脈數者，麥門冬湯主之。

澤漆湯方： 仲溫服五合，咽喉不利，脈數者，麥門冬湯主之。

澤漆湯方： 仲溫服五合，咽喉不利，脈數者，麥門冬湯主之。

大青龍湯方：

麻黃六兩（去節）桂枝二兩（去皮）甘草二兩（炙）石膏如雞子大（碎）杏仁四十個（去皮尖）生薑三兩（切）大棗十二枚（劈）

上七味，以水九升，先煮麻黃，減二升，去上沫，內諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，覆微似汗，不汗再服。

膈間支飲，其人喘滿，心下痞堅，面色黧黑，其脈沉緊，得之數十日，醫吐下之，不愈者，木防己湯主之。不差，木防己去石膏加茯苓芒硝湯主之。

木防己湯方：

木防己三兩 桂枝二兩 茯苓四兩 人參四兩 石膏十二枚（雞子大）桂枝二兩 人參四兩

上四味，以水六升，煮取二升，去滓，分溫再服。

木防己去石膏加茯苓芒硝湯方：

木防己三兩 桂枝二兩 茯苓四兩 人參四兩 芒硝三合 上四味，以水六升，煮取三升，去滓，內芒硝，再微煎，分溫再服，微利則愈。

木防己去石膏加茯苓芒硝湯方：

木防己三兩 桂枝二兩 茯苓四兩 人參四兩 芒硝三合 上四味，以水六升，煮取三升，去滓，內芒硝，再微煎，分溫再服，心下有支飲，其人苦冒眩，澤瀉湯主之。

澤瀉湯方：

澤瀉五兩 白朮二兩 上二味，以水二升，煮取一升，分溫再服。

支飲，胸滿者，厚朴大黃湯主之。

厚朴大黃湯：

厚朴八兩 大黃四兩 上二味，以水五升，煮取二升，去滓，溫服一升，不差再服。

支飲，不得息，葶藶大棗瀉肺湯主之。（方見前）

支飲，口不渴，作嘔者，或吐水者，小半夏湯主之。

小半夏湯方：

半夏一升 生薑半斤 上二味，以水七升，煮取一升半，去滓，分溫再服。

腹滿，口舌乾燥，腸間有水氣者。防己椒目葶藶大黃丸主之。

防己椒目葶藶大黃丸方：

防己一錢 椒目一錢 葶藶一錢 大黃一錢 小半夏湯方：

上四味，搗篩，煉蜜爲丸，如梧桐子大，先食，飲服一丸，日三服，

去滓，分溫三服。

小青龍湯方：

麻黃三兩 甘草三兩（炙）桂枝三兩 茯苓三兩 五味子半升 乾薑三兩

上六味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，溫服一升，日三服夜三服。

咳逆，倚息，不得臥，脈浮弦者，小青龍湯主之。

青龍加石膏湯亦主之。

越婢加半夏湯方：

桔梗一兩 甘草二兩 上二味，以水三升，煮取二升，去滓，分溫再服。

咳而氣逆，喘鳴迫塞，胸滿而脹，一身面目浮腫，鼻出清涕，不聞香臭，此爲肺脹。葶藶大棗瀉肺湯主之。

似咳非咳，唾多涎沫，其人不渴，此爲肺冷。甘草乾薑湯主之。

甘草乾薑湯方：

甘草四兩（炙）乾薑二兩（炮） 上二味，以水三升，煮取一升五合，去滓，分溫再服。

上五味，以水九升，先煮麻黃，減二升，去上沫，納諸藥，煮二升半，去滓，溫服八合，覆取微汗。不汗再服，得汗停後服。

風水，脈浮，身重，汗出，惡風者。防己黃耆湯主之。

中防己黃耆湯方：

華防己一兩 甘草五錢（炙）白朮七錢半 黃耆一兩

上四味，剉如麻豆大，每抄五錢匙，生薑四片，大棗一枚，水一升半，煮取八合，去滓，溫服。喘者，加麻黃五錢。胃中不和者，加芍藥三分。氣上衝者，加桂枝三分。下有陳寒者，加細辛三分。服後當如蟲局行皮中，從腰下如冰，後坐被上，又以被繞腰下，溫令有微汗，差。

印越婢湯方：

傷麻黃六兩 石膏半斤 甘草二兩 生薑三兩 大棗十二枚

寒上五味，以水六升，先煮麻黃，去上沫，納諸藥，煮取三升，去滓，分溫三服。

雜皮水，四肢腫，水氣在皮膚中，四肢聳動者。防己茯苓湯主之。

病防己茯苓湯方：

論 防己三兩 黃耆三兩 桂枝三兩 茯苓六兩 甘草二兩（炙）

上五味，以水六升，煮取三升，分溫三服。

桂裏水，一身面目黃腫，其脈沉，小便不利。甘草麻黃湯主之。越婢加林朮湯亦主之。

古甘草麻黃湯方：

本甘草二兩 麻黃四兩

東上二味，以水五升，先煮麻黃，去上沫，納甘草，煮取三升，去滓，溫服一升，復令汗出，不汗再服。

漢越婢加朮湯方：

仲麻黃六兩 石膏半斤 甘草二兩（炙）生薑三兩 大棗十五枚 白朮四兩

張仲曰：黃汗之爲病，身體腫。若重汗出，而發熱口渴，狀如風水。汗出六味，以水六升，先煮麻黃，去上沫，納諸藥，煮取三升分溫三服。

景沾衣，色正黃如柏汁，脈自沉，從何得之？

著師曰：以汗出入水中浴，水從汗孔入得之。宜黃耆芍藥桂枝湯。

黃耆芍藥桂枝湯方：

黃耆五兩 芍藥三兩 桂枝三兩

上六味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

寸口脈沉而弱，沉即主骨，弱即主筋，沉即爲腎，弱即爲肝。汗出水中，如水傷心，歷節，黃汗出，故曰歷節。

味酸則傷筋，筋傷則緩，名曰泄。鹹則傷骨，骨傷則痿，名曰枯。枯泄相搏，名曰斷泄。榮氣不通，衛不獨行，榮衛俱微，三焦無御，四肢斷絕，身體羸瘦，獨足腫大，黃汗出，兩脛熱，便爲歷節。

少陰脈浮而弱，弱則血不足，浮則爲風，風血相搏，即疼痛如掣。

肥盛之人，脈澀小，短氣，自汗出，歷節疼，不可屈伸，此皆飲酒，汗出當風所致也。

諸肢節疼痛，身體羸瘦，腳腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐者。桂枝芍藥知母甘草湯主之。

桂枝芍藥知母甘草湯方：

桂枝三兩 芍藥三兩 知母二兩 甘草二兩

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

烏頭五枚（切） 麻黃三兩 黃耆三兩 芍藥三兩 甘草三兩

上五味，先以蜜兩升煮烏頭，取一升，去滓，別以水三升，煮四味，取一升，去滓，納蜜，再煮一二沸，服七合，不知，盡服之。

婦人經水前斷，後病水者，名曰血分，此病難治。先病水，後經血斷，名曰水分，此病易治，水去則經自下也。

少陽脈卑，少陰脈細，男子則小便不利，婦人則經水不利，名曰血分。

少陽脈急，少陰脈緩，男子則小便不利，婦人則經水不利，名曰血分。

婦人經水前斷，後病水者，名曰血分，此病難治。先病水，後經血斷，名曰水分，此病易治，水去則經自下也。

少陽脈急，少陰脈緩，男子則小便不利，婦人則經水不利，名曰血分。

黃汗之病，兩脛自冷。假令發熱，此屬歷節。食已汗出，暮常盪汗，心煩，服至六七日乃解。若心煩不止者，以苦酒阻，故也，以美酒醯，易之。

此榮氣熱也。若身重，汗出已徹，輕者，久久身必甲錯。發熱不止者，久必生瘡瘍。若身重，汗出已徹，輕者，久久身必甲錯。發熱不止者，久痛，又從腰以上汗出，以下無汗，腰腹弛痛，如有物在皮中狀。劇則學不能食，身疼痛，煩躁，小便不利。此爲黃汗，桂枝加黃耆湯主之。

桂枝加黃耆湯方：

桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩（炙）生薑三兩（切）大棗十五枚

黃耆二兩

上六味，以苦酒一升，水七升相和，煮取三升，去滓，溫服一升，當心煩，服至六七日乃解。若心煩不止者，以苦酒阻，故也，以美酒醯，易之。

此榮氣熱也。若身重，汗出已徹，輕者，久久身必甲錯。發熱不止者，久

痛，又從腰以上汗出，以下無汗，腰腹弛痛，如有物在皮中狀。劇則學

不能食，身疼痛，煩躁，小便不利。此爲黃汗，桂枝加黃耆湯主之。

桂枝加黃耆湯方：

桂枝三兩 芍藥三兩 甘草二兩（炙）生薑三兩（切）大棗十五枚

黃耆二兩

上六味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

寸口脈沉而弱，沉即主骨，弱即主筋，沉即爲腎，弱即爲肝。汗出

水中，如水傷心，歷節，黃汗出，故曰歷節。

味酸則傷筋，筋傷則緩，名曰泄。鹹則傷骨，骨傷則痿，名曰枯。枯

泄相搏，名曰斷泄。榮氣不通，衛不獨行，榮衛俱微，三焦無御，四

屬斷絕，身體羸瘦，獨足腫大，黃汗出，兩脛熱，便爲歷節。

少陰脈浮而弱，弱則血不足，浮則爲風，風血相搏，即疼痛如掣。

肥盛之人，脈澀小，短氣，自汗出，歷節疼，不可屈伸，此皆飲酒，汗出當風所致也。

諸肢節疼痛，身體羸瘦，腳腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐者。桂枝芍

藥知母甘草湯主之。

桂枝芍藥知母甘草湯方：

桂枝三兩 芍藥三兩 知母二兩 甘草二兩

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

烏頭五枚（切） 麻黃三兩 黃耆三兩 芍藥三兩 甘草三兩

上五味，先以蜜兩升煮烏頭，取一升，去滓，別以水三升，煮四味，取一升，去滓，納蜜，再煮一二沸，服七合，不知，盡服之。

病歷節，疼痛，兩足腫大，小便不利，脈沉緊者。甘草麻黃湯主之。

版

上五味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

寸口脈沉而弱，沉即主骨，弱即主筋，沉即爲腎，弱即爲肝。汗出

水中，如水傷心，歷節，黃汗出，故曰歷節。

味酸則傷筋，筋傷則緩，名曰泄。鹹則傷骨，骨傷則痿，名曰枯。枯

泄相搏，名曰斷泄。榮氣不通，衛不獨行，榮衛俱微，三焦無御，四

屬斷絕，身體羸瘦，獨足腫大，黃汗出，兩脛熱，便爲歷節。

少陰脈浮而弱，弱則血不足，浮則爲風，風血相搏，即疼痛如掣。

肥盛之人，脈澀小，短氣，自汗出，歷節疼，不可屈伸，此皆飲酒，汗出當風所致也。

諸肢節疼痛，身體羸瘦，腳腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐者。桂枝芍

藥知母甘草湯主之。

桂枝芍藥知母甘草湯方：

桂枝三兩 芍藥三兩 知母二兩 甘草二兩

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

烏頭五枚（切） 麻黃三兩 黃耆三兩 芍藥三兩 甘草三兩

上五味，先以蜜兩升煮烏頭，取一升，去滓，別以水三升，煮四味，取一升，去滓，納蜜，再煮一二沸，服七合，不知，盡服之。

病歷節，疼痛，兩足腫大，小便不利，脈沉緊者。甘草麻黃湯主之。

版

上五味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

寸口脈沉而弱，沉即主骨，弱即主筋，沉即爲腎，弱即爲肝。汗出

水中，如水傷心，歷節，黃汗出，故曰歷節。

味酸則傷筋，筋傷則緩，名曰泄。鹹則傷骨，骨傷則痿，名曰枯。枯

泄相搏，名曰斷泄。榮氣不通，衛不獨行，榮衛俱微，三焦無御，四

屬斷絕，身體羸瘦，獨足腫大，黃汗出，兩脛熱，便爲歷節。

少陰脈浮而弱，弱則血不足，浮則爲風，風血相搏，即疼痛如掣。

肥盛之人，脈澀小，短氣，自汗出，歷節疼，不可屈伸，此皆飲酒，汗出當風所致也。

諸肢節疼痛，身體羸瘦，腳腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐者。桂枝芍

藥知母甘草湯主之。

桂枝芍藥知母甘草湯方：

桂枝三兩 芍藥三兩 知母二兩 甘草二兩

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

烏頭五枚（切） 麻黃三兩 黃耆三兩 芍藥三兩 甘草三兩

上五味，先以蜜兩升煮烏頭，取一升，去滓，別以水三升，煮四味，取一升，去滓，納蜜，再煮一二沸，服七合，不知，盡服之。

病歷節，疼痛，兩足腫大，小便不利，脈沉緊者。甘草麻黃湯主之。

版

師曰：病人面無色，無寒熱，脈沉弦者，必衄血。脈浮而弱，按之則絕者，必下血。煩而咳者，必吐血。

從春至夏，衄血者，屬太陽也。從秋至冬，衄血者，屬陽明也。

華師曰：若身有瘡，被刀斧所傷，上血故也，此名金瘡。無瘡者，王不

留行散主之。有瘡者，排膿散主之。排膿湯亦主之。

書王不留行散方：

局王不留行十分（燒）蒴藋細葉十分（燒）桑根白皮十分（燒）甘草十

印黃芩二分 蜀椒三分（去目）厚朴二分 乾薑三分 苓藥二分

傷上九味爲散，飲服方寸匙，小瘡即粉之，大瘡但服之，產後亦可服。

寒排膿散方：

枳實十六枚 苓藥六分 桔梗二分

雜上三味，杵爲散，取雞子黃一枚，以藥散與雞黃相等，揉和令相得，

病飲和服之，日一服。

論排膿湯方：

甘草二兩 桔梗三兩 生薑一兩 大棗十枚

桂上四味，以水三升，煮取一升，去滓，溫服五合，日再服。

林浸淫瘡。從口流向四肢者，可治。從四肢流來入口者，不可治。

古浸淫瘡。黃連粉主之。

本黃連粉方：

黃連十分 甘草十分

東上二味，搗爲末，飲和方寸匙，並粉其瘡上。

漢諸浮數脈，法當發熱，而反灑淅惡寒，若有痛處，當發其癰。

張師曰：諸癰腫者，欲知有膿無膿，以手掩膿（應爲“腫”）上。熱者，

爲有膿。不熱者，爲無膿也。

仲腸癰之爲病，其身甲錯，腹皮急，按之濡，如腫狀。腹無積聚，身無

景熱，脈數，此爲腸內有癰也。薏苡附子敗醬散主之。

著薏苡附子敗醬散方：

薏苡十分 附子二分 敗醬五分

上三味，杵爲末，取方寸匙，以水三升，煮減半，頓服，小便當下血。

書主之。

局桂枝甘草麻黃生薑大棗細辛附子湯方：

桂枝三兩 甘草二兩（炙）麻黃三兩 生薑二兩（切）大棗十二枚

印細辛三兩 附子一枚（炮）

傷上七味，以水七升，先煮麻黃，去沫，納諸藥，煮取三升，分溫三服，

寒汗出即愈。

水飲，心下堅大如盤，邊如旋杯。枳實白朮湯主之。

病枳實七枚 白朮二兩

論上二味，以水五升，煮取三升，去滓，分溫三服。

桂小便不利，其人有水氣。若渴者，栝蔞瞿麥薯蕷丸主之。

栝蔞瞿麥薯蕷丸方：

栝蔞根二兩 瞿麥一兩 薯蕷二兩 附子一枚（炮）茯苓三兩

古上五味，末之，煉蜜爲丸，如梧桐子大，飲服二丸，日三服。不知，

本可增至七八丸。以小便利，腹中溫爲知。

小便不利，其人有水氣。在血分者，滑石亂髮白魚散主之。茯苓白朮

東戎鹽湯亦主之。

漢滑石亂髮白魚散方：

張滑石一斤 亂髮一斤（燒）白魚一斤

上三味，杵爲散，飲服方寸匙，日三服。

仲茯苓白朮戎鹽湯方：

景茯苓半斤 白朮二兩 戎鹽二枚（彈丸大）

著上三味，先以水一斗，煮三味，取三升，去滓，納戎鹽，更上微火一

二沸化之，分溫三服。

少腹腫痞，按之即痛如淋，小便自調，時時發熱，自汗出，復惡寒，此爲腸外有癰也。其脈沉緊者，膿未成也；下之，當有血。脈洪數者，膿已成也，可下之。大黃牡丹湯主之。

大黃牡丹湯方：

大黃四兩 牡丹一兩 桃仁五十個 冬瓜子半升 芒硝三合

上五味，以水六升，煮取一升，去滓，頓服之。有膿者，當下膿。無

膿者，當下血。

辨胸痹病脈證並治

師曰：夫脈當取太過不及，陽微陰弦，即胸痹而痛。所以然者，責其極虛也。今陽虛，知在上焦。胸痹而痛者，以其脈弦故也。

平人無寒熱，胸痹，短氣不足以息者，實也。

胸痹。喘息，咳唾，胸背痛，寸脈沉遲，關上小緊數者，栝薑薤白白酒湯主之。

栝薑薤白白酒湯方：

栝薑實一枚（搗）薤白半斤 白酒七升

上三味，同煮取二升，分溫再服。

栝薑薤白半夏湯方：

栝薑薤白半夏湯二兩 半夏半升 白酒一斗

上四味，同煮取四升，去滓，溫服一升，日三服。

栝薑人參湯方：

栝薑實薤白桂枝厚朴栝薑湯方：

枳實四枚 薤白半斤 桂枝一兩 厚朴四兩 栝薑實一枚（搗）

上五味，以水五升，先煮枳實、厚朴，取二升，去滓，納諸藥，煮數

沸，分溫三服。

栝枝人參湯方：

桂枝四兩 人參三兩 乾薑三兩 白朮三兩

上五味，以水一斗，先煮四味，取五升，納桂枝，更煮取三升，去滓，

溫服一升，日三服。

栝薑人參湯方：

桂枝三兩 桃仁二十枚 蟲蟲二十枚（去足）

上三味，末之，練蜜和丸，以酒一升，水一升，煮取八合，頓服之。

血下如豚肝，愈。

膈間停留瘀血，若吐血，色黑者。桔梗湯主之。

桔梗湯方：

桔梗一兩 甘草二兩

上二味，以水三升，煮取一升，去滓，分溫再服。

吐血不止者，柏葉湯主之。黃土湯亦主之。

柏葉湯方：

柏葉三兩 乾薑三兩 艾葉三把

上三味，以水五升，取馬通汁一升合煮，取一升，去滓，分溫三服。

黃土湯方：

灶中黃土半斤 甘草三兩 地黃三兩 白朮三兩 附子三兩（炮）阿膠三

兩 黃芩三兩

上七味，以水八升，煮取三升，去滓，頓服之。

心氣不足，吐血。若衄血者，瀉心湯主之。

瀉心湯方：

赤小豆三升（浸令毛出曝乾）當歸十兩

上二味，杵爲散，漿水和服方寸匙，日三服。

赤豆當歸散方：

上二味，先便而後血者，此遠血也。黃土湯主之。（方見前）

下血，先血而後便者，此近血也。赤豆當歸散主之。

版 男 猛 夷 東

溫服一升，日三服。
婦人懷妊。腹中**病痛**。當歸芍藥散主之。

當歸芍藥散方：

中當歸三兩 芍藥一斤 茯苓四兩 白朮四兩 漢藥半斤 芍藥三兩
華上六味，朮爲散，取方寸匙，溫酒和，日三服。

妊娠。嘔吐不止。乾薑人參半夏丸主之。

乾薑人參半夏丸方：

書乾薑一兩 人參一兩 半夏二兩

局上三味，末之，以生薑汁糊爲丸，如梧桐子大，每服五丸，日三服，飲下。

印妊娠。小便難，飲食如故。當歸貝母苦參丸主之。

傷當歸貝母苦參丸方：

寒當歸四兩 貝母四兩 苦參四兩

桂上三味，末之，煉蜜爲丸，如小豆大，飲服三丸，日三服。

雜妊娠。有水氣，小便不利，灑淅惡寒，起即頭眩。葵子茯苓散主之。

病葵子茯苓散方：

論葵子一斤 茯苓三兩

桂上二味，杵爲散，飲服方寸匙，日三服。小便利則愈。

婦人妊娠。身無他病。宜常服當歸散。則臨產不難，產後亦免生他病。

林當歸散方：

古當歸一斤 黃芩一斤 芍藥一斤 芎薑一斤 白朮半斤

本上五味，杵爲散，酒服方寸匙，日再服。

妊娠。身有寒濕，或腹痛，或心煩心痛，不能飲食，其胎躍躍動者，東宜養之。白朮散主之。

漢白朮散方：

張白朮 芎薑 蜀椒（去目汗） 牡蠣 各等分

仲婦人懷身七月。腹滿，不得小便，從腰以下如有水狀，此太陰當養不景養，心氣實也。宜瀉勞宮、關元，小便利則愈。

著問曰：新產婦人有三病。一者病瘻。二者病鬱冒。三者大便難。何謂也？

師曰：新產血虛，多汗出，喜中風，故令病瘻。亡血復汗，寒多，故

論葵子十五兩 大附子十枚（炮）

印上二味，杵爲散，白飲和服方寸匙，日三服。

傷胸痹。心中懸痛者。桂枝生薑枳實湯主之。

寒桂枝生薑枳實湯方：

桂枝三兩 生薑三兩 枳實五枚

雜上三味，以水六升，煮取三升，去滓，分溫三服。

病胸痹。胸痛徹背，背痛徹胸者。烏頭赤石脂丸主之。

論烏頭赤石脂丸方：

桂頭一兩 蜀椒一兩 附子五錢 赤石脂一兩 乾薑一兩

桂上五味，末之，蜜爲丸，如梧桐子大。先食，服一丸，日三服，不知

林稍增，以知爲度。

古胸痹。其人常欲蹈其胸上，先未苦時，但欲飲熱者。旋覆花湯主之。

本旋覆花三兩 薤十四莖 新絳少許

東上三味，以水三升，煮取一升，頓服。

漢胸痹。心下悸者，責其有痰也。半夏麻黃丸主之。

張半夏麻黃丸：

仲上二味，末之，練蜜和丸，如小豆大，飲服三丸，日三服。

著半夏麻黃各等分

著九痛丸方：

附子三兩 狼毒四兩 巴豆一兩（去皮心熬研如脂）人參一兩 乾薑一兩

令鬱冒。亡津液，胃燥，故大便難。
產婦鬱冒。其脈微弱，嘔不能食，大便反堅，但頭汗出。所以然者，血虛而厥，厥而必冒。冒家欲解，必大汗出。以血虛下厥，孤陽上出，故頭汗出也。所以產婦喜汗出者，亡陰血虛，陽氣獨盛，故當汗出，陰陽乃復。大便堅，嘔不能食者，小柴胡湯主之。

小柴胡湯方：

柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 甘草三兩 半夏半升（洗）生薑三兩（切）

大棗十二枚（劈）

上七味，以水一斗，先煮二物，取五升，去滓，納大黃，更煮取二升，去滓，納芒硝，更上微火一二沸，分溫再服。得下，停後服。

產後。腹中**病痛**，若虛寒不足者。當歸生薑羊肉湯主之。

當歸生姜羊肉湯方：

當歸三兩 生薑五兩 羊肉一斤

上四味，以水一斗，先煮二物，取五升，去滓，納大黃，更煮取二升，去滓，納芒硝，更上微火一二沸，分溫再服。得下，停後服。

產後。腹痛，煩滿不得臥，不可下也。宜枳實芍藥散和之。

產後。腹中**病痛**，若虛寒不足者。當歸生薑羊肉湯主之。

當歸生姜羊肉湯方：

當歸三兩 生薑五兩 羊肉一斤

上三味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

產後。腹痛，煩滿不得臥，不可下也。宜枳實芍藥散和之。

枳實芍藥散方：

上二味，杵爲散，服方寸匙，日三服，麥粥和下之。

師曰：產後。腹痛，法當以枳實芍藥散。假令不愈，必腹中有瘀血著臍下也。下瘀血湯主之。

枳實芍藥等分

上二味，杵爲散，服方寸匙，日三服，麥粥和下之。

師曰：產後。腹痛，法當以枳實芍藥散。假令不愈，必腹中有瘀血著臍下也。下瘀血湯主之。

下瘀血湯方：

大黃三兩 桃仁二十枚（去皮尖） 蟻蟲二十枚（去足）

上三味，末之，煉蜜和丸，以酒一升，煮取八合，頓服之。當下血如猛

豚肝。

產後。七八日，無太陽證，少腹堅痛，此惡露不盡也。若不大便，煩

躁，發熱，脈微實者，宜和之。若日晡所煩躁，食則譫語，至夜即愈，

者。大承氣湯主之。（方見前）

吳茱萸二兩

上六味，末之，蜜丸如梧桐子大，酒下，強人初三丸，日三服，弱者二丸。兼治卒中惡，腹脹痛，口不能言。又治連年積冷，流注，心胸

痛，冷氣上衝，落馬，墜車，血疾等皆主之。忌口如常法。

辨婦人各病脈證並治

桂枝湯主之。於法六十日，當有此證。設有醫治逆者，卻一月。加吐下者，則絕之。

桂枝湯方：

桂枝三兩（去皮） 芍藥三兩 甘草二兩（炙） 生薑三兩（切）

大棗十二枚（劈）

上五味，以水七升，煮取三升，去滓，分溫三服。

婦人宿有癥病，經斷未及三月，而得漏下不止，胎動在臍上者，此爲癥痼害。妊娠六月動者，前三月經水利時，胎也。下血者斷後三月，訶也。所以血不止者，其癥不去，故也。當下其癥。桂枝茯苓丸主之。

桂枝 茯苓 牡丹 桃仁 芍藥 各等分

上五味，末之，煉蜜爲丸，如兔屎大，每日食前服一丸，不知，可漸加至三丸。

婦人懷孕六七月，脈弦，發熱，其胎愈脹，腹痛，惡寒，少腹如扇，所以然者，子臟開，故也。當以附子湯溫之。

附子湯方：

附子二枚（炮去皮破八片） 人參二兩 白朮四兩 芍藥三兩

上七味，以水八升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。

師曰：婦人有漏下者。有半產後，續下血，都不絕者。假令妊娠腹中痛者，此爲胞阻。膠艾湯主之。

膠艾湯方：

地黃六兩 芍藥二兩 阿膠二兩 艾葉三兩 當歸三兩 芍藥四兩 甘草二兩

芍藥三兩

上七味，以水五升，清酒二升，先煮六味，取三升，去滓，納膠烊消，溫服一升，曰三服。中婦人少腹滿如敦狀，小便微難而不渴，或經後產後者，此爲水與血俱華結在血室也。大黃甘遂阿膠湯主之。

大黃甘遂阿膠湯方：

醫 大黃四兩 甘遂二兩 阿膠二兩

書上三味，以水三升，煮三味，取一升，去滓，納膠烊消，溫頓服之。

寒婦人經水閉。臟堅癖，下白物不止，此中有乾血也。礬石丸主之。

局婦人時腹痛。經水時行時止，止而復行者，抵當湯主之。

抵當湯方：

印水蛭三十個（熬）虻虫三十枚（去翅足）桃仁三十個 大黃三兩

傷上四味，以水五升，煮取三升，去滓，溫服一升，不下更服。

寒婦人經水閉。臟堅癖，下白物不止，此中有乾血也。礬石丸主之。

雜礬石三分（燒）杏仁一分

病上三味，末之，煉蜜爲丸，如棗核大，納臟中。劇者，再內之。

論婦人六十二種風證，腹中氣血如刺痛者，紅藍花酒主之。

桂紅藍花酒方：

桂紅藍花一兩

林上一味，以酒一斗，煎減半，去滓，分溫再服。

古婦人腹中諸病痛者。當歸芍藥散主之。小建中湯亦主之。（當歸芍藥本散方見前）

小建中湯方：

東桂枝三兩 芍藥六兩 甘草二兩 生薑三兩（切）大棗十二枚（劈）

漢飴糖一升

張上六味，以水七升，煮取三升，去滓，納膠飴，更上微火消解，溫服

仲一升，曰三服。

問曰：婦人病，飲食如故，煩熱不得臥，而反倚息者，何也？

景師曰：此名轉胞，不得溺也。以胞系了戾，故致此病。但利小便則愈，著腎氣丸主之。

腎氣丸方：

地黃八兩 薯蕷四兩 山茱萸四兩 澤瀉三兩 牡丹皮三兩 伏苓三兩

桂枝一兩 附子一枚（炮）

上八味，末之，煉蜜和丸，梧桐子大，溫酒下十五丸，日再服，不知，漸增至二十五丸。

婦人陰寒。蛇床子散主之。

蛇床子散方：

蛇床子二兩

上一味，末之，以白粉少許，和合相得，如棗大，綿裹內陰中，自溫，洗之，日四遍。

胃氣下泄，陰吹而喧。如失氣者，此穀道實也。豬膏髮煎主之。

豬膏半斤 亂髮三枚（如雞子大）

上二味，和膏煎之，髮消藥成，分再服。

狼牙湯方：

狼牙三兩

上一味，末之，以水四升，煮取半升，去滓，以綿纏箸如繭大，浸湯瀝陰中，

洗之，日四遍。

少陰脈滑而數者，陰中瘡也。蝕爛者，狼牙湯主之。

蛇床子散方：

蛇床子二兩

上一味，末之，以白粉少許，和合相得，如棗大，綿裹內陰中，自溫。

院婦人陰寒。蛇床子散主之。

狼牙湯方：

狼牙二兩

上一味，末之，以水四升，煮取半升，去滓，以綿纏箸如繭大，浸湯瀝陰中，

洗之，日四遍。

胃氣下泄，陰吹而喧。如失氣者，此穀道實也。豬膏髮煎主之。

豬膏半斤 亂髮三枚（如雞子大）

上二味，和膏煎之，髮消藥成，分再服。

狼牙湯方：

狼牙二兩

上一味，末之，以水四升，煮取半升，去滓，以綿纏箸如繭大，浸湯瀝陰中，

洗之，日四遍。

少陰脈滑而數者，陰中瘡也。蝕爛者，狼牙湯主之。

蛇床子散方：

蛇床子二兩

上一味，末之，以白粉少許，和合相得，如棗大，綿裹內陰中，自溫。

院婦人陰寒。蛇床子散主之。

蛇床子散方：

蛇床子二兩

上一味，末之，以白粉少許，和合相得，如棗大，綿裹內陰中，自溫。

院婦人陰寒。蛇床子散主之。

蛇床子散方：

蛇床子二兩

上一味，末之，以白粉少許，和合相得，如棗大，綿裹內陰中，自溫。